

Domestikationserscheinungen am Schädel und Gebiß.

Ein Vergleich von Farm- und Wildfüchsen.

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der zahnärztlichen Doktorwürde

der

Hohen Medizinischen Fakultät

der

Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität

zu Bonn.

Vorgelegt am 22. April 1937

von

Paul Rose,

Zahnarzt

aus Bernkastel-Kues.

Gedruckt mit Genehmigung der medizinischen Fakultät
der Universität Bonn.

Referent: Prof. Dr. Korkhaus.

Korreferent: Prof. Dr. Wagenseil.



Inhaltsverzeichnis.

Vorwort: Die Bedeutung der Domestikation

Einleitung: Der Begriff der Domestikation

Hauptteil: Die Domestikation und die Art ihrer Auswirkungen

A. Beim Tier:

1. Einflüsse auf den Gesamtkörper
2. Einflüsse auf den Schädel
 - a) auf den Hirnschädel
 - b) auf den Gesichtschädel
 - c) auf Kiefer und Zähne.

B. Beim Menschen:

1. Einflüsse auf den Gesamtkörper
2. Einflüsse auf den Schädel
 - a) auf Hirn- und Gesichtschädel
 - b) auf Kiefer und Zähne.

C. Eigene Untersuchungen: Vergleich von Farm- und Wildfüchsen

1. Aufgabe, Material u. Methodik der Untersuchungen
 2. Die Befunde:
 - a) am Hirnschädel
 - b) am Gesichtschädel
 - c) am Kiefer
 - d) an den Zähnen.
 3. Zusammenfassung
 4. Tabellen
 5. Abbildungen
 6. Literaturverzeichnis.
-

Bedeutung der Domestikation.

Die Erforschung des Domestikationsproblems ist eine wichtige und interessante Aufgabe. Schon allein die Tatsache, so betont K l a t t, daß unsere Physiologie eine am Haustier gewonnene und darauf sich stützende Disziplin ist, unterstreiche die Wichtigkeit der Klärung dieses Problems. Andererseits müßte auch der Erbforscher das größte Interesse an dieser Frage haben, weil ja unsere Erblehre von domestizierten Tieren oder Pflanzen entwickelt ist. Zöge man freilebende Tiere dazu heran, so wären sie mit dem Augenblick, da sie in einer größeren oder kleineren Umfriedung gehalten werden, schon den Anfängen der Domestikation unterworfen.

Auch der Tierzüchter findet in dem Studium der Domestikation mit ihren somatischen Einflüssen und morphologischen Gestaltungsänderungen ein hervorragendes Rüstzeug. Schon H. v. Nathusius weist in seinem grundlegenden und sich eingehend mit den Domestikationseinwirkungen befassenden Werk: „Vorstudien für Geschichte und Zucht der Haustiere zunächst am Schweineschädel“ 1864 darauf hin: „wie deutlich der Züchter die Möglichkeit der Gestaltung seiner Tiere in Händen hat“.

Nur durch die Kenntnis dieser Domestikationsfolgen vermag der Zoologe in der Erforschung der Stammesgeschichte unserer Haustiere oft erst seine Schlüsse zu ziehen. Wenn bei den Untersuchungen der Abstammung unserer Hausrinder — um ein Beispiel zu nennen — C. K e l l e r noch 5 verschiedene Stammformen zugrunde legt, konnte A d a m e t z den Kreis enger ziehen und diese auf drei Urformen zurückführen. Ja andere nehmen nur eine diphyletische, N e h r i n g sogar eine monophyletische Abstammung an, indem jeweils die anderen Rasseeigentümlichkeiten nur als durch die Domestikation bedingt erklärt werden, die dann erst zu den einzelnen Kulturformen bzw. zu Mischformen innerhalb dieser führten. Der Forscher braucht, um mit A n t o n i u s zu

sprechen, auch nicht mehr in den Fehler zu verfallen, für jede prähistorische Ausprägung nach einer eigenen diluvialen Stammform zu suchen.

Auch Tiere in der Freiheit können unter ähnliche Bedingungen und Wirkungen geraten, wie sie der Domestikation eigen sind. So suchten einige Forscher z. B. das Kleinerwerden mancher Insektiere durch die besondere Abgeschlossenheit und Einschränkung des Lebensareals zu erklären. Selbst die Eindämmung und Einschränkung, die die Kultur für den Lebensraum unseres Wildes mit sich brachte, blieb auf dieses nicht ohne Einwirkung.

Ja nach Kenntnis mancher Domestikationserrscheinungen war es letzten Endes kein großer Sprung mehr, aus den Höhlenbärfunden den Höhlenbär, eine freilebende diluviale Tierform, als eine infolge von Inzucht und Degeneration hervorgegangene Varietät des Braunbären zu identifizieren, trotzdem beide Formen sich sowohl in Körpergröße als auch in anderen Merkmalen ganz wesentlich voneinander entfernen. Eine große Formabweichung kann also trotz naher Blutsverwandtschaft vorkommen.

Nicht zuletzt aber ist auch der Anthropologe, der Rassenforscher, der Mediziner an dem Problem interessiert, da auch der Mensch selbst als domestiziert gelten kann. Schon H a h n hatte 1896 dieses ausgesprochen, indem er annahm, daß auch der „Oberherr“ von den Gesetzen der Domestikation nicht unberührt geblieben sei. Die Domestikationsidee auf den Menschen angewandt bezeichnet E. F i s c h e r als „gut fundiert“. „Von ihrem Standpunkte aus erheben sich eine Menge neuer Fragen, andere treten in neue Beleuchtung.“

Begriff der Domestikation.

Was versteht man nun zunächst unter dem Ausdruck „Domestikation“?

Als domestiziert bezeichnet H a h n solche Haustiere, die der Mensch in seine Pflege übernommen hat, die sich hier regelmäßig fortpflanzen und eine Reihe erworbener Eigentümlichkeiten auf ihre Nachkommen übertragen. E. F i s c h e r kann sich dieser De-

finition nicht restlos anschließen; er erachtet diese bezüglich der Fortpflanzung erworbener Eigenheiten als etwas gewagt. Nach ihm gelten als domestiziert solche Tiere (auch Pflanzen), deren Ernährungs- und Fortpflanzungsverhältnisse der Mensch eine Reihe von Generationen willkürlich beeinflusst. In der Domestikation bestimmt der Mensch die Nahrung der Tiere in ihrer Menge (Maß, zuweilen auch Hunger), in ihrer Qualität (Fettanreicherer, Kraftnahrung), in ihrer Abwechslung oder Monotonie (Stallfütterung, Salz, Kalkdarreichung, Verteilung auf Hauptmahlzeiten). Überdies beeinflusst der Mensch die Muskeltätigkeit (Arbeit, Überarbeit, Ruhe durch Raumbeschränkung, Stilllegen zur Maß, Ersparnis der Nahrungsfuche), und den Wärmehaushalt (Stall, Decken). Gefangene Tiere gelten nach ihm nicht als domestiziert, auch nicht die Nachkommenschaft gefangener Tiere in zoologischen Gärten, weil nicht eine Reihe von Generationen sich hier fortpflanzt.

N e h r i n g dagegen sagt: „Als Anfang der Domestikation (bei Wildschweinen) darf man wohl die Einschließung oder Eingatterung eines bestimmten kleineren Waldreviers bezeichnen.“ K l a t t präzisiert in seiner „Theorie der Domestikationswirkung“ folgendermaßen: „Der Begriff „Domestikationszustand“ wird (dazu) zweckmäßigerweise nicht so eng gefaßt, wie das gewöhnlich geschieht, wo nur solche Formen als domestiziert bezeichnet werden, die sich regelmäßig in Gefangenschaft fortpflanzen, bei denen also auch der Ablauf des Fortpflanzungsgeschäftes menschlichen Eingriffen zugänglich ist.“ So notwendig die Kenntnis dieser eigentlichen „Haustiere“ sei, so wäre das große Heer der Tiere, die „halbwild“ in größeren Parks oder mehr oder weniger „zähm“ im Hause oder im Käfig des zoologischen Gartens gehalten werden, nicht minder wichtig. Bei dieser weiten Fassung des Domestikationsbegriffes ergeben sich ohne weiteres verschiedene Stufen dieses Zustandes. Selbst bei engerer Fassung, wo das echte Haustier allein als domestiziert gilt, sind Abstufungen vorhanden (primitive Rassen, Kulturrassen). Man könne gleichsam eine Skala aufstellen, deren einzelne Stufen bestimmt werden durch das „mehr oder minder Rationelle in der Methode der Züchtung“.

Nach Weidenreich liegt das Wesentliche bei der Domestikation darin, daß der Mensch die Tiere aus ihrer gewohnten Umgebung, an die sie angepaßt sind, herausnimmt und in eine anders geartete Umgebung versetzt; gegenüber dem früheren Milieu bedeute das eine Einengung des Luft- und Lichtgenusses und des speziellen Wohnplatzes. Auf der anderen Seite seien dem Tier diejenigen Betätigungen genommen, die Gegenstand seiner täglichen Lebensforge sind. Es wird vor den Nachstellungen seiner Feinde schließlich auch seiner eigenen Artgenossen, sowie vor den Unbilden des Klimas und der Witterung geschützt. Eine zureichende Ernährung wird gewährleistet und geregelt. Die Nahrung ist dabei meist reichlicher bemessen, und da sie selbst aus Kulturprodukten besteht, auch ihr Nährwert größer. Das Verabreichen des Futters in gekochtem Zustande bedeute gleichfalls eine nicht unwesentliche Änderung gegenüber den ursprünglichen Verhältnissen.

Die Domestikation und die Art ihrer Auswirkungen.

A. Beim Tier.

1. Einflüsse auf den Gesamtkörper.

Als eine der ersten auffallenden Erscheinungen in der Domestikation tritt eine Verkleinerung der Gesamtgröße bei fast allen domestizierten Tieren ein.

Schon das Einsperren wilder Schweine in mehr oder weniger große Bezirke, sogenannte Sauparks, bringt nach Nehring deutlich verkleinerte Tiere; denn dadurch werden die Tiere in der Freiheit beschränkt, einseitiger ernährt und den Folgen der Inzucht ausgesetzt. Wenn diese Maßnahme schon eine Verkleinerung der Nachkommen hervorruft, dann erst recht bei der Haustierwerdung, weil die Domestikation demgegenüber eine weitere Verschlechterung der Existenzbedingungen bedeutet. Diese verkleinernde Wirkung auf das Skelett und die sonstigen Wirkungen auf die heranwachsenden Tiere steigern sich noch bis zu einem bestimmten Grade in den folgenden Generationen bis zu einer Stufe, auf der sie dann gleichsam völlig auf das veränderte Milieu eingestellt und angeglichen halten. Von hier aus folgt allmählich wieder eine Zunahme

mit dem Maße, mit dem der Mensch diese Tierzucht aufbessert, indem er die Nahrungs-, Entwicklungs- und Haltungsverhältnisse der Tiere in geeignete Bahnen bringt. Dann wird diese Verkleinerung meist nicht nur wettgemacht, sondern es kann sogar eine Zunahme an Größe und Körpermasse über das Wildmaß hinaus folgen.

Nicht bei allen Tieren werden sich diese Größenvariationen ergeben. Von der Katze ist z. B. bekannt, daß sie sich sehr beständig hielt (sie stammt von der ägyptischen Falbkatze, nicht von unserer Wildkatze ab). Auch bei Ziege und Schaf gehen die Formen nicht nennenswert über die wilden Vorfahren hinaus. Bei anderen Arten kann es sogar durch die Domestikation sofort zu einer Größenzunahme kommen. So neigt das Kaninchen sehr leicht zum Riesenwuchs; es ist kaum möglich, eine Rasse auf der Größe der Wildform zu halten (Müller). Diese Eigentümlichkeit trifft auch für das Geflügel zu, das seine Ahnen an Größe meist übertrifft. Die sog. Zwergaffen beim Geflügel, wie Zwerghühner und Zwergenten, stehen kaum hinter der Wildgröße zurück.

Bei einzelnen Haustieren führt die verkleinernde Wirkung der Domestikation durch geeignete Zuchtwahl zur Bildung von Zwergassen.

Nach Weidenreich kann man zwischen allgemeiner und partieller Klein- oder Zwergwüchsigkeit unterscheiden. Bei ersterer bleiben die Proportionen der normalen Großformen gewahrt, sind gleichsam Miniaturausgaben der großen Formen, abgesehen von Abweichungen in der Kopfform. Die Kopfform ist nämlich durch das Dominieren des Gehirnschädels über den Gesichtschädel bestimmt. Bei der zweiten Form bleiben einzelne Teile im Wachstum zurück; zumeist sind es die Extremitäten wie bei Dachshund, afrik. Zwergziege und engl. Krüperhuhn. Bei letzterem ist die Aufzucht in später Jahreszeit und Kalkmangel der Nahrung Voraussetzung für die Herausbildung der Abnormität dieser Kurzfüßigkeit. Hier ist also die Abnormität keineswegs schon fixiert wie etwa beim Dackel. Bei der partiellen Kleinwüchsigkeit handelt es sich um eine Hemmung im Knochenlängenwachstum bei Fortdauer des Dickenwachstums. Wenn man diese Erscheinung nicht direkt als patho-

logisch bezeichnen kann, so ist sie doch das Zeichen einer Störung des normalen Entwicklungsablaufes (Weidenreich).

Auch andere Erscheinungen sind als abnormer Entwicklungsablauf aufzufassen, so etwa bei den hochgezüchteten Schweinerrassen, die späte Verwachsung der Diaphysen und Epiphysen an den Röhrenknochen und das lange Offenbleiben der Schädelnähte.

Die Knochen selbst zeigen bei den Domestikationsformen eine eigenartige Weichheit, die auf einer Kalkarmut bei ziemlich normaler Knochenstruktur oder auf einer übermäßigen Markraumbildung mit weiten Spongiosaräumen und dünnen Knochenbalken beruhen kann. Man braucht nur an den weicheren und plumperen Knochenbau beim Hauschwein gegenüber dem Wildschwein zu denken. Die einzelnen Knochen sind poröser, leichter nachgiebig und weniger widerstandsfähig. Nach Feststellungen Henselers besitzen die domestizierten Schweine gegenüber der Wildform eine an anorganischem Material ärmere Knochensubstanz.

Diese Knochenveränderung beruht auf einer Störung des Kalkstoffwechsels, begünstigt durch den Mangel an Licht und Sonne. Wolfgram konnte an seinem domestizierten Wolfschädelmaterial direkte rachitische Schädigungen feststellen. Weidenreich weist in diesem Zusammenhange eingehend auf den Komplex der Rachitis und die Bedeutung der Vitamine hin. Dabei begünstigt eine überreichliche Nahrungsaufnahme die rachitischen Erscheinungen, während umgekehrt Unterernährung nicht zur Rachitis führt. Die allgemeinen Veränderungen in der Knochensubstanz, die bei einzelnen Kulturformen als eine Art Rasseeigentümlichkeit auftreten, sind aber nicht als eine ausgesprochene Krankheit zu beurteilen. Der Organismus hat sich durch die langdauernde Domestikation auf den abnormen Reiz entsprechend einzustellen vermocht, sodaß keine eigentliche Allgemeinschädigung, sondern nur eine andere Reaktionsart vorliegt.

War dieser Erscheinungskomplex schon durch die anders geartete Ernährung und durch die Licht- und Luftbeschränkung mitbedingt, so werden durch die Bewegungseinschränkung andere Wirkungen erklärlich. Sie wird eine Abschwächung und Gewichtsabnahme der betr. Muskulatur nach sich ziehen, die sich wiederum

auf den Knochen überträgt. So zeigen z. B. die Hausrindknochen, worauf R ü t i m e y e r aufmerksam macht, viel verwachsenere Formen, schwächere Muskelanfätze und weniger scharfe Gelenkfacetten. Nach K l a t t ist das Gewicht der Gesamtmuskulatur z. B. beim Hund kleiner als beim Wildhund im Vergleich zu seinem Gesamtkörpergewicht, das Skelett dagegen hat beim Haushund höhere Werte.

Andererseits kann im Laufe der Domestikation auch eine bessere Entwicklung einzelner Muskelpartien und Knochen eintreten, so beim Rennpferd bestimmte Muskelgruppen, wieder andere bei den schweren Zugschlägen unserer Pferde (A n t o n i u s).

B e t h k e weist darauf hin, daß durch die Bewegungseinschränkung die Tätigkeit des Herzmuskels eine geringere wird und eine Gewichtsabnahme desselben bedingt. Auch der Verdauungsapparat stellt sich durch die andersgeartete Nahrung um; so findet bei allen Raubfägern eine bedeutende Längenzunahme des Darmes statt, wenn die Ernährungsweise sich auf eine pflanzliche umstellt. Unsere Hauskatze besitzt demzufolge einen längeren Darm als das Wildtier, der Haushund einen längeren als Wolf oder Schakal (worauf unsere Haushunde zurückgehen), das zahme Frettchen einen längeren Darm als der wilde Iltis.

Als eine weitere Folge der Bewegungseinschränkung und der überreichen Ernährung können wir die in der Domestikation auftretende Neigung zur Fettablagerung auffassen. Nicht immer braucht diese Fettablagerung sich vornehmlich auf das gesamte Unterhautgewebe zu erstrecken, wie bei Schwein, Rind und Hund. Es gibt auch bevorzugte Fattanreicherung an bestimmten Körperteilen, so beim Schaf in der Gegend der Schwanzwurzel (Fettschwanzschafe und Fettsteißschafe) oder — ähnlich wie beim Kamel — beim Zebu die Rückengegend in Form eines Höckers, wodurch das Tier den Namen Buckelrind erhielt.

Ganz wesentliche Veränderungen erfährt auch das Haarkleid; und zwar findet man bei den Haustierrassen Einwirkungen im Pigmentsystem in Form von Albinismus, Melanismus, Falbheit, Fleckung und bunten Schlägen, andererseits direkte Formveränderungen

des Haarkleides, wie Wollbildung z. B. bei den Schafen, Angorabildung bei Katze, Meerschweinchen, Ziege, Kaninchen.

Auch Vermehrung des Haarkleides tritt auf, so z. B. beim Pferd die üppigere Mähnen- und Schweifbehaarung. Gleichzeitig ist die typisch kurze, stehende Mähne des Wildpferdes zu einer Hängemähne geworden.

Eine starke Rückbildung in der Behaarung sehen wir beim Schwein. Beim Ceylon-Nackthund ist fast völlige Haarlosigkeit eingetreten.

Hierhin gehören auch die Abänderungen, die das Gehörn, sei es in der Form oder in seiner Größe, bei Ziege und Rind erfährt. Meist ist das Gehörn bei den domestizierten Rindern einfacher geformt und viel schwächer entwickelt. Diese Schwächung kann sich bis zur vollständigen Hornlosigkeit steigern. Natürlich wird dadurch auch die Form des Schädels in tiefgehender Weise beeinflusst. (Rassen mit rückwärts verlaufenden Hörnern zeigen eine vorgewölbte Stirn (Büffel), im Gegensatz zu dem flachen oder beinahe konkaven Schädelprofil bei nach vorn gerichtetem Gehörn (Ur, Yak). Bei Ziege und Schaf kommt es zuweilen zu einer Spaltung der Hornanlagen, sodaß vierhörnige Exemplare entstehen.

Eine weitere Änderung findet man beim Fettschwanzschaf, wo eine Vermehrung der Schwanzwirbelzahl eintritt, während beim Fettsteißschaf eine Verminderung vorliegt. Eine noch stärkere Verminderung sehen wir bei stummelschwänzigen Hunden und Katzen.

Von sonstigen Veränderungen wäre noch eine eigenartige Schlaffheit und Fältelung der Haut besonders im Gesicht bei einigen Rassen (Hund, Schwein), zu nennen. Vor allem sind auch die Hängeohren als ein ausgesprochenes Domestikationszeichen zu werten (Schwein, Hund, Schaf, Kaninchen, mitunter auch Ziege und Rind).

Zum Schluß sei noch kurz auf einige Veränderungen in der Geschlechtsphäre hingewiesen, wie etwa die Änderung des Brunstzyklus, die rasche Aufeinanderfolge der Geburten, die nicht mehr an bestimmte Jahreszeiten gebunden ist, und die bedeutend gesteigerte und über längere Zeit sich erstreckende Milchabsonderung bei den Milchtieren. Ebenso ist das Geflügel erst in der

Domestikation zum tüchtigen Eierlegen herangezüchtet worden. Andererseits ist es bekannt, daß viele Wildtiere, die in Gefangenschaft geraten, nicht weiter züchten. Darwin hat uns auch Beispiele von Unfruchtbarkeit bei Haustieren angeführt, wenn solche Tiere in ein anderes Klima versetzt werden.

Wir sehen also, wie die Domestikation die Entwicklung von Variationen bedingt, sie züchtet und schützt. Oft können diese Veränderungen so gesteigert sein, daß die Tiere, wenn sie plötzlich ihre Freiheit wieder erhalten, in der freien Natur gar nicht mehr existenzfähig sind.

2. Einflüsse auf den Schädel.

a) Auf den Hirnschädel.

Nach Klatt liegen die Fähigkeiten, die Variationen in der Domestikation zu entwickeln, schon im Wildtier. Wesentlich ist aber dabei die Intensität der Domestikation. Nicht, wie lange ein Tier, eine Rasse schon domestiziert ist, sondern in welchem Grade, in welcher Form die Domestikation verbracht wird, ist von ausschlaggebender Bedeutung (Fabian).

So ist es z. B. zuweilen aufgrund der Haltung nicht immer möglich, eine scharfe Grenze zwischen dem gemeinen Hauschwein und seiner wilden Stammart, unserem Wildschwein, zu ziehen, da Wildschweine, wenn sie unter günstigere, üppigere Ernährungsbedingungen geraten, dem zahmen Typus sehr nahe kommen können, und umgekehrt Zahmschweine bei rauher und karger Haltung wieder den Wildtypus anzunehmen vermögen (Nehring, Bäumlcr). Gemäß der Intensität der Domestikation und der entsprechenden Zuchtwahl unterscheidet man primitive Rassen und hochgezüchtete sog. Kulturrassen.

Von allen Veränderungen, die aber eintreten, sind die tiefgreifendsten und bedeutendsten die Umgestaltungen am Schädel. Wenn man nun kurz die Umformungen am Schädel betrachtet, so wird man zweckmäßig visceralen und neuralen Schädelteil trennen, indem nämlich der Gesichtschädel weit stärker und in ganz anderen Ausmaßen sich verändert, als der Hirnschädel. So fand z. B.

Wolfgram bei Wölfen aus der Gefangenschaft für den Gesichtschädel eine relative Verkürzung, für den Hirnschädel eine Verlängerung. Klatt fand bei Wildtieren, die im Zoo aufwuchsen, eine Verringerung der Hirnkapazität gegenüber den freilebenden Tieren. Bekannt ist auch eine Verringerung der Kapazität des Hirnschädels bei den Haustieren gegenüber der Wildform, die entweder durch eine Minderentwicklung der Sinnesorgane oder durch erbliche Verschiedenheiten, die im Laufe der Domestikation auftraten, bedingt ist. Analog dazu fand Klatt bei Haustieren, die verwildert waren, eine Zunahme, so bei verwilderten Katzen gegenüber der Hauskatze. Beim Haushund fand er im Gegensatz zu den Wildhunden allerdings, daß die vordere Hirnhälfte, besonders der Stirnteil zugenommen hatte; die hintere Hälfte dagegen zeigte an einzelnen Stellen eine Abnahme. Die Scheitelgegend war wieder stärker entwickelt. Erklärlich erscheint ihm dies durch die Abnahme der Sehphäre beim Haushund, ferner durch eine Abnahme im Riechgebiet. Die Veränderung in der Scheitelgegend beruhe in einer Zunahme der parietalen Assoziationszentren. Er faßt sein Ergebnis zusammen: „Das Hundehirn hat in der Domestikation einen völligen Umbau seiner ganzen Organisation erlitten, derart, daß mit den höheren psychischen Vorgängen in Beziehung stehende Assoziationszentren mit samt ihrer durch höchstwahrscheinlich überall hin sich erstreckende Bahnen zugenommen haben auf Kosten der niederen Projektionszentren mit ihrem Zubehör, welche abgenommen haben.“

Nun spielt sogar die Art der Aufzucht bei der Hirnentwicklung eine Rolle. Nach Henseler traten nämlich infolge einer reichen und kargen Fütterungsweise ganz auffallende Unterschiede in den Hirngewichten auf und zwar ein absolutes Überwiegen der Hirnmasse bei den Hungertieren gegenüber den Masttieren. Überreichliche Ernährung hemmt also die Gehirnentwicklung oder, wie Weidenreich sagt, die ungünstige Ernährungsweise, die die Entwicklung des ganzen Körpers hintanhalt, habe dennoch auf das Wachstum des Gehirns und speziell des Großhirns keinen Einfluß, während umgekehrt übermäßige Ernährung geradezu zu einer Unterentwicklung der Gehirnmasse führe.

Bei der Betrachtung der Abänderungen hatte *Wolffgram* bei in Gefangenschaft aufgewachsenen, besonders aber bei in Gefangenschaft geborenen Wölfen eine absolute Verkleinerung des Schädels in allen Dimensionen festgestellt, wobei zugleich eine relative Höhenzunahme stattfand. Für die einzelnen Schädelkomponenten fand er, wie schon erwähnt, für den Gesichtschädel eine relative Verkürzung, für den Hirnschädel eine relative Verlängerung bei gleichzeitiger Verbreiterung beider Teile. Während also der Schädel bei den wilden Wölfen lang, schmal und niedrig ist, ist er bei den Gefangenschaftstieren höher, breiter und im Schnauzenteil kürzer geworden. Am Hirnschädel selbst erfuhr die Breite an der Sutura temporalis und an der Hinterecke der Temporalia eine wesentliche Breitenzunahme; eine ebensolche Verbreiterung konnte *Wolffgram* an der Hirnbasis, vor allem im Abstand der Foramina condyloidea nachweisen. Auch war der Jochbogen, insbesondere der Ramus temporalis oss. jugul. schwächer gekrümmt, ebenso resultierten abweichende Befunde in der Stirn- und Schläfengrube. Ferner stellte er eine Senkung der Gehirnbasis im hinteren Abschnitt und eine gleichzeitige Vorwärtschiebung fest. Die Basis selbst erlitt eine Verkürzung, die Gehirnkapsel dagegen eine Vergrößerung unter Einbiegung der vorderen Wand.

Wichtige Befunde hatte vorher schon *H. v. Nathusius* für das Hauschwein festgestellt. Auch hier ist Höhe und Breite des Schädels eine größere als beim Wildschwein. Dazu ist die Richtung des Hinterhaupts völlig verändert. Liegt beim Wildschwein die Mitte des oberen Randes des Occipitalkamms (Opisthokranion) hinter dem unteren Rand des Foram. magn., so beim Hauschwein vor demselben. Die fächerförmige Schuppe des Hinterhaupts ist in ihrem oberen Teil also nach vorn gerichtet. Dadurch verringert sich der Unterschied zwischen der Profillänge und der Basilarlänge, ja er kann sogar ganz schwinden. Durch das Aufsteigen und Vorwärtsneigen der fächerförmigen Schuppe ist natürlich auch das Scheitelbein konsekutiv stark verändert. Auch hier steht die Schläfengrube steiler. Der Keilbeinkörper ist auch in die Veränderungen einbezogen, zumal der Basilarteil des Hinterhaupts an dieser sich aufrichtenden und nach vorn strebenden Tendenz beteiligt ist. Der

untere Rand des Foram. magn. steht höher und damit über der Ebene, die durch die Backzahnreihe gebildet wird. Damit ist also auch eine veränderte Basallinie des Gehirnschädels gegeben. Alle Veränderungen sind natürlich bei den Landschweinen nicht so hochgradig wie bei den Kulturrassen. Beim hochgezüchteten Schwein erscheinen im Gebiete der Orbita die Knochen stark verdickt, unregelmäßig gewulstet. Der Schädel macht dadurch den Eindruck, als ob er verbeult sei.

Schaf und Ziege zeigen im Schädelbau nur wenig Domestikationsmerkmale, abgesehen von umgestaltenden Einflüssen, die durch die Minderentwicklung oder durch den Fortfall des Gehörns bedingt sind.

Beim Hausrind ist für die meisten Rassen eine Schädelverkürzung eingetreten, die sich aber vornehmlich auf den Gesichtsteil bezieht. Auch beim Rind sind aus der Abänderung des Gehörns sich ergebende Umgestaltungen am Hirnschädel eingetreten. „Es ist klar,“ so schreibt Antonius, „daß ein so schwerer Anhang, wie ihn das Gehörn vieler Rinder darstellt, die Form des Schädels in tiefgehender Weise beeinflussen muß, denn der Schädel ist schließlich so gut wie jeder andere Teil des Skeletts gewissermaßen ein Kompromiß der verschiedenen Anforderungen, die an ihn gestellt werden, und der erbten Form.“

b) Auf den Gesichtschädel.

Viel bedeutender als die Erscheinungen am Hirnschädel sind die Veränderungen am Gesichtschädel. Es wurde schon erwähnt, daß bei den Wölfen eine relative Verkürzung des Gesichtsteils eingetreten war. „Aus dem langen, schmalen, niedrigen Schädel mit langer Schnauze ist ein kurzer, breiter, hoher Schädel mit kurzer Schnauze geworden,“ so hatte Wolfgram das Ergebnis der Abänderungen zusammengefaßt. Dabei hatte sich die Schnauze aufgerichtet unter gleichzeitiger Verdrängung aboralwärts. Das Umgekehrte hatte er für den Hirnschädel festgestellt. Es sei jedoch bemerkt, daß Wolfgram auch bei einer Gruppe amerikanischer Wölfe aus der Freiheit eine Aufrichtung der Schnauze angetroffen hat, und er schließt daraus, daß die bedingenden Ursachen dieser

eigentümlichen Erscheinung auch außerhalb der Gefangenschaft bei freilebenden Tieren vorhanden sein müssen. Nach seinen Untersuchungen muß eine Drehung der Schnauze um eine quer durch die Grenze des Gesichts- und Gehirnschädels gelegte Achse stattgefunden haben. Durch diese Drehung wird die Profillinie stärker konkav. Außerdem senkt sich der Gaumen und die Fossa gutturalis, wodurch wiederum Veränderungen im Choanenteil bedingt sind.

Der Gesichtsteil, jener Abschnitt, dem in der Freiheit im Kampf ums Dasein eine außerordentlich wichtige Rolle zufällt, konnte sich in der Gefangenschaft, wo die Selbsterhaltungsfrage fortfällt, unbeschadet zurückbilden.

Was nun die auslösenden Ursachen der Veränderungen am Gesichtschädel betrifft, so dachte Wolfgram sich eine „retrahierende Kraft“, welche die Verkürzung bedinge. Bei den Wildtieren wirke dem nun eine äußere ziehende Kraft entgegen, die sich beim Erbeuten, Zerren und Reißen der Nahrung entfalte. Durch den Wegfall dieser Momente bei den gefangenen Tieren werde der retrahierenden Kraft kein Widerstand mehr entgegengesetzt.

Beim Hauschwein ¹⁾ ist die Profillinie im Gesichtsteil vor den Augen stärker gefenkt. Hier richtet sich nämlich die Stirn, die beim Wildschwein in Verlängerung der Nase gleichmäßig ansteigt, steiler nach oben. Damit ist aber die Einsenkung zwischen Nase und Stirn gegeben. Natürlich gibt es unter den einzelnen Schädeln hier starke Differenzierungen, je nach der Rasse und Haltung.

Die Verkürzung im Gesichtschädel ist am schönsten zu sehen, wenn man sich eine Ebene durch die beiden Vorderaugenpunkte (der am meisten oral liegende Punkt am Augenrand) senkrecht auf die Grundebene (Auflageebene) vorstellt. Diese Lotebene wird beim Zahmschwein immer vor den letzten Molaren die Zahnreihe schneiden, während sie beim Wildschwein diese nicht schneidet, sondern weit hinter der Zahnreihe verläuft. Mit dem kürzeren Gesichtschädel ist auch hier eine größere Gesichtsbreite verbunden. Waren diese Veränderungen schon beim gemeinen Landschwein festzustellen, so treten sie noch deutlicher bei den Kulturrassen zu Tage.

¹⁾ Das Schwein zeigt wie kein anderes Tier besonders starke Domestikationserrscheinungen.

Das Profil ist hier tief konkav. Die sonst nach unten gerichtete Spitze der Nase steht nach oben aufwärtsgebogen und zwar so stark, daß die Eckzähne des Unterkiefers hinter die Eckzähne des Oberkiefers zu stehen kommen, was, wie H. v. Nathusius betont, in der Säugetierwelt einzigartig da steht. Der Unterkiefer strebt dieser Aufbiegung nach und erhält eine steilere Kinnsymphyse. Der ganze Schädel macht einen um seine Auflagefläche nach vorn stark zusammen gedrängten und gebogenen Charakter, wobei deutlich Gesicht- und Hirnschädel ineinander gestaucht sind. Lag beim Wildschweinschädel der aboralste Punkt sehr hoch, fast an höchster Stelle des Hinterhauptbeins (Opisthokranion), so liegt er bei den Kulturaffen tiefer, entweder auf dem Dorselfortsatz oder gar auf dem aufsteigenden Ast des Unterkiefers, dessen Winkel zu einem spitzen geworden ist. H. v. Nathusius sagt einmal: „Könnte man den trockenen alten Schädel eines Wildschweins erweichen, so würde man durch einen von hinten nach vorn wirkenden Druck auf die fächerförmige Schuppe des Hinterhaupts, bei gleichzeitiger Abstützung der Nasengegend, die bisher betrachtete Schädelform des Hauschweins darstellen können und umgekehrt durch Ziehen an dem oberen Rand der fächerförmigen Schuppe nach hinten und gleichzeitigem Druck auf die Nase, würde man den Schädel des Hauschweins in einen Wildschweinschädel umformen können.“

Das starke Hervortreten dieser Eigenschaften, wie sie sich bei den Kulturaffen zeigen, bezeichnet man nach demselben Autor als Mopsköpfigkeit. Auch Wolgram hatte die Einbiegung bei den domestizierten Wölfen und Schakalen als ähnlich denen beim Schwein bezeichnet und dieselbe Bezeichnung „Mopsköpfigkeit“ nach H. v. Nathusius gewählt. Er erwähnt, daß die Schädel der in Gefangenschaft geborenen Wölfe einem Mopschädel mehr gleichen als dem ihrer wilden Brüder. Mit dem Ausdruck „Mopsköpfigkeit“ soll nach Weidenreich die Ähnlichkeit mit der Kopfbildung eines Mopses angedeutet werden, d. h. daß dieser Kopf oder Schädel sich in erster Linie durch eine bedeutende Verkürzung des Gesichtsteils und damit durch ein stärkeres Hervortreten des Gehirnschädels auszeichnet. Diese Gesichtsverkürzung ist durch eine mehr oder weniger ausgesprochene Einziehung im Grenzgebiet von

Nase und Stirn charakterisiert. Damit setzt sich der Gehirnschädel in Form einer Stirnbildung scharf vom Gesichtsteil ab. Die Einziehung wird also an dieser Stelle eine Konkavität des Profils bedingen ganz im Gegensatz zu den Wildformen, wo die Profillinie entweder ebenmäßig weiterläuft oder sogar leicht konvex ist. Die konkave Stelle selbst bezeichnet man als Einfattelung oder als Einbug. Bei der ganzen Ausprägung der Mopsköpfigkeit gegenüber der Wildschädelform spielen die Stirnhöhlen nach Weidenreich eine bestimmte Rolle. Außer beim Hund, beim gefangenen Wolf und Schakal, beim Schwein, insbesondere bei den frühreifen Rassen ist auch beim Rind Mopsköpfigkeit bekannt und zwar haben sie Darwin und Nathusius zuerst beim Niatarind geschildert. Sie tritt aber auch bei anderen Rindern auf. Die Stirn erscheint hier breit und auffallend kurz; der vordere Gesichtsteil des Schädels ist stark verkürzt nach oben gekrümmt und in der Gegend der Nasenwurzel tritt eine Knickung auf. Der Unterkiefer ist stärker gebogen und seine Schneidezähne stehen vor dem Zwischenkieferrand. H. v. Nathusius erwähnt, daß diese Erscheinung auch bei Schafen vorkommt. Bei Rind und Schaf haben diese Mopskopfbildungen eine erschwerte Nahrungsaufnahme zur Folge, indem die Tiere kurze Pflanzen auf der Weide nicht abbeißen können.

Auch beim Pferd, wie Antonius erwähnt, hauptsächlich beim Araberpferd findet man diese Bildung, wenn auch niemals in so erheblichem Maße wie in den vorgenannten Fällen. Während beim Pferde sonst allgemein das Profil gerade oder konvex verläuft, kommt es hier in ähnlicher Weise zur Ausbildung einer Einfenkung.

Bei Schaf und Ziege ist die Mopsköpfigkeit nicht mit einer Eindellung sondern umgekehrt mit einer Ausdellung der Gesichtspartie, der sogenannten Buckelnase verbunden.

Nach Weidenreich ist die Mopsköpfigkeit eine Deformationsercheinung, die durch die mechanische Beanspruchung der schlecht verkalkten, weichen Knochen durch die Kaumuskulatur hervorgerufen wird. Der hinterste Kieferabschnitt ist nämlich unter dem Gehirnschädel gelegen. Dieser Kieferabschnitt ist dadurch nach dem Hirnschädel hin durch Verstreben und Widerlager abgestützt, wodurch er eine bestimmte Unnachgiebigkeit erhält. Kämme

es hier zu deformierenden Einwirkungen durch den Kaudruck, so könnte sich diese höchstens in Form einer Höhenabnahme und Verbreiterung im Jochbogen- und Wangengebiet auswirken. Weiter nach vorn aber entfernt sich die Schnauze immer mehr von dem Widerlager. Hier wird der vom Unterkiefer her wirkende Kaudruck den vorderen Teil des Oberkiefers nach seiner Unterstützungsfläche hin abdrängen und die Schnauze sich nach oben verbiegen können. Der Unterkiefer folgt dann dieser Aufbiegung und nimmt hierbei eine stärkere bogenförmige Biegung im vorderen Abschnitt an. Beim Schwein kommen noch die Einwirkungen der Rüsselmuskulatur hinzu, die die Aufbiegung des oberen Teiles unterstützen. Bei den Wiederkäuern zeigt der hintere Kieferabschnitt durch die großen und starken Mahlzähne eine besondere Betonung, während der vordere Kieferabschnitt durch die Verkümmernng der Schneide- und Eckzähne an Bedeutung verliert. Bei diesen Tieren wird sich, wenn eine Nachgiebigkeit der Knochen vorliegt, diese in einer Durchbiegung des Gesichtschädels äußern, wie die buckelnafigen Schafe und Ziegen beweisen. Hier ist also dann der Mittelteil des Gesichtschädels stärker vorgewölbt. Ein Bild übrigens, daß uns an eine gewisse Ähnlichkeit mit der stärkeren Entwicklung des Mittelgesichts beim Deckbiß des Menschen erinnern könnte.

N e h r i n g und H. v. N a t h u s i u s räumen dem durch die Domestikation bedingten Mangel an Wühltätigkeit beim Hauschwein einen wichtigen Einfluß auf die Herausbildung der mopskopfähnlichen Erscheinungen ein. Durch das Wühlen und durch die damit in Aktion tretenden Muskeln greifen diese so an, daß sie die fächerförmige Schuppe nach hinten ziehen und damit auch das Stirn- und Scheitelbein nach unten drücken, wodurch dann das gerade Profil sich ergebe. Hinzu kommt, daß der Gebrauch des Rüssels, der die hinteren Teile des Kopfes nach hinten und unten drängt, zugleich die vorderen Teile nach vorn und unten zieht. Diese Wühl- und Muskelwirkungen müssen aber auch auf das Verhältnis der Länge des Kopfes zu seiner Breite sich auswirken. Jedoch hebt der letzte Autor hervor, daß dadurch nicht allein die Längenbreitenverhältnisse geklärt sind, weil noch die Ernährung wichtige Unterschiede in dieser Richtung bedinge. Denn die Erfahrung lehrte

ihr, und seine Experimente haben es ihm immer wieder bestätigt, daß reichliche Ernährung einen kurzen und breiten, karge Ernährung einen langen und schmalen Schädel erzeugt.

Auch B ä u m l e r hält die Wühltätigkeit als mit formbestimmend für das gerade Profil der Wildschweine, doch die vorgenannten Faktoren genügen ihm nicht allein für die Umgestaltungen. Nach ihm kommt der Kaumuskulatur der wesentlichste Einfluß auf die Verbiegungen zu, indem die einzelnen Muskeln aktiv und passiv diese Verbiegungen herbeiführen, zumal der Knochen beim domestizierten Tier viel weicher und nachgiebiger ist.

Es ist demgegenüber aber m. E. zu bedenken, daß bei vielen Tieren, die oft ihre Nahrung nur einzuschlüpfen brauchen, bei denen also diese Muskulatur infolge der Inaktivität am wenigsten entwickelt ist, gerade die hochgradigeren Verbiegungen sich zeigen.

Nun hat H e n f e l e r mit Wurfgeschwistern des bayerischen Land Schweins Versuche angestellt, nach welchem er der Muskulatur, die beim Wühlen in Frage kommt, ein formbildendes Moment abspricht; denn es gelang ihm bei seiner Hungergruppe, der durch gepflasterte Ställe und durch Nasenringe alle Gelegenheit zum Wühlen genommen war, denselben Schädeltyp wie beim Wildschwein zu erzielen. Und zwar, wie er glaubt, allein durch die Ernährungsweise; denn die Geschwister der Mastgruppe zeigten trotz der Gelegenheit zum Wühlen ein konkaves Profil und die kurze, breite Kopfform. Nach ihm hat also die Wühltätigkeit auf die Kopfform keinen bestimmenden Einfluß. So klar und anschaulich man auch nach der Beschreibung N e h r i n g s durch die Wirkung des Wühlens den Schädel förmlich länger und schmaler werden sehe, so stehe dieser Auffassung aber die Tatsache gegenüber, daß er bei Schweinen, denen jede Gelegenheit zum Wühlen genommen war, auf experimentellem Wege die Kopfformen nach beiden Richtungen hin erzielen konnte. Nur durch den Einfluß der Ernährung habe sich bei seinen Versuchstieren auf der einen Seite ein eingeknickter, relativ kurzer und breiter, auf der anderen ein langer, gerader, schmaler Kopf herausgebildet.

Die Ansicht H e n f e l e r s ist fast allgemein übernommen worden.

Seinen Ergebnissen möchte ich jedoch folgendes entgegenhalten. Ich muß dazu auf die Stelle zurückgreifen, in der er das Verhalten der Mast- und Hungertiere (auf S. 43) charakterisiert; er schildert dort, daß die Masttiere träge waren, sich möglichst wenig bewegten und viel schliefen, sich durch nichts stören ließen und meist liegen blieben, wenn man an den Stall trat. Die Hungertiere waren im Gegensatz dazu den ganzen Tag auf den Beinen, sie durchstöberten den Stall und das Streustroh andauernd bis zum letzten Eckchen und Stückchen, um nichts liegen zu lassen, was freßenswert erschien. Wenn sie sich ganz selten einmal hingelegt hatten, waren sie dicht nebeneinander wie in Reih und Glied zusammengedrängt; die Ohren hielten sie gespitzt und wie „gestochen“ sprangen die Tiere auf, sobald ein Geräusch bemerkbar wurde.

Nun wird aber gerade durch die ständige Bewegung und das ständige Durchstöbern, das die Tiere ja den ganzen Tag hindurch taten, sich eine starke Ausbildung der Hals- und Nackenmuskulatur und der Rüsselmuskulatur ausgeprägt haben. Die Nackenmuskulatur wird sicher bei der vielen Betätigung der Hinterhaupt beeinflusst haben, wie auch die Rüsselmuskulatur ihre aktive Wirkung auf den Knochen geltend machen konnte. Dazu kommt, daß die Tiere in ihrem Hungergefühl — sie wurden ja äußerst karg ernährt — sich reichlich mit dem Zerkauen und Fressen von Stroh beschäftigt haben. Nicht so sehr das kurze Kauen ihrer kärglichen Futterration (die sie in ihrem Heißhunger wohl nicht einmal richtig zerkauten), als dieses beständige Kauen und Zerkauen wird zu einem kräftigeren und intensiver verkalkten Kiefer- und Schädelknochen geführt haben, die einer Verbiegung Vorschub leisteten. Der Ansicht H e n - f e l e r s, daß bei üppig genährten Tieren, denen Gelegenheit zum Wühlen gegeben ist, trotzdem die Schädelform nicht anders ausfiel, als wenn sie diese Gelegenheit nicht gehabt hätten, ist entgegenzuhalten, daß diese Masttiere in ihrem Sättigungsgefühl garnicht die Neigung und das Bedürfnis zu intensivem Wühlen zeigen werden, weil das Wühlen zur Nahrungssuche dient.

M.E. find, entgegen der Ansicht H e n f e l e r s, Nackenmuskulatur und Rüsselmuskulatur doch als wichtige formbildende Faktoren für die Schädelgestaltung anzusprechen. Nicht der Unterschied

der reichlichen und kargen Ernährung allein wird die verschiedene Schädelform bedingt haben, sondern bei den Hungertieren trat in dem Durchstöbern des Stalles eine Form der Nahrungssuche hinzu. Um etwas „Freßenswertes“ zu finden, mußten die Tiere den ganzen Tag in Bewegung sein. Das bedingt eine stärkere Beanspruchung der Hals- und Rüsselmuskulatur, dazu trat der günstige Einfluß des beständigen Kauens und Zerkauens des Strohens.

Auch in der freien Natur gibt es unter den Wildschweinen Kümmerer; die andern besser genährten und entwickelten Wildschweine zeigen jedoch ein ebenso gerades Profil. Beiden ist aber die Nahrungssuche nicht erspart geblieben. Daher erklärt es sich auch, daß Wildschweine, unter üppigen Ernährungseinflüssen, wie erwähnt, der Form des Landschweines zustreben, weil eben hier die Nahrungssuche nicht mehr die intensiven Formen anzunehmen braucht. Ja, ich glaube sogar, wenn man Wurfgeschwistern eine gleich reichliche Nahrung zukommen ließe, nur mit dem Unterschied, daß man der einen Gruppe das Futter in großen Portionen reichte, während man der anderen Gruppe dieses Futter, bei möglichst großem Stallraum, im Stall zerstreute (am besten so, daß es nicht zu rasch gefunden, also etwa zwischen dem Streuhstroh herausgefucht werden müßte) und die Fütterung in vielen kleinen Rationen vornähme, wobei die Tiere den größten Teil des Tages über mit der Suche der Nahrung beschäftigt wären, daß dann ebenfalls ein Unterschied in der Kopfform erfolge.

Durch diese Einwände soll aber keineswegs gesagt sein, daß der Nahrung selbst nach ihrer Qualität und Quantität bei der Schädelgestaltung nicht eine ganz wesentliche Bedeutung zukommt. H. v. Nathusius hat gesagt: „Derjenige, welcher reichlich und gedeihlich ernährt und alle schädlichen Einflüsse zu beseitigen versteht, erzielt Tiere mit kurzem Kopf und eingebogenem Gesicht, der andere, in dessen Stall diese Bedingungen nicht erfüllt werden, erzielt dieselben Ferkel zu langköpfigen Tieren mit geradem Profil.“ Nur so versteht man auch, daß durch eine reichlichere Ernährung bei entsprechender Haltung und gesteigerter Pflege es beim gemeinen Landschwein zu derselben extremen Kopfform wie bei den edlen Schlä-

gen kommen kann. Klatt und Krohn haben bei Versuchen an Teichmolchen mit verschiedenartiger Ernährung bei den Tieren mit ausschließlicher Muschelfleischernährung eine relativ kürzere, breitere und höhere Kopfform erhalten. Bei diesen Tieren machte der gedrungene plumpe Kopf mit seiner Verbreiterung des Hirnschädels einen glotzügigen Eindruck. Auch war der Unterkiefer verkürzt und deutlich in seinem Wachstum gegenüber dem Oberkiefer zurückgeblieben.

Zum Schluß sei noch erwähnt, daß die formgestaltenden Einflüsse sich nur in der Jugend geltend machen; denn nur im jugendlichen Alter ist die Ernährungsweise und die Haltung auf das ganze Tier von Einfluß. Gerät ein Tier später in Gefangenschaft, so bleibt die Schädelgestalt im wesentlichen unverändert.

Nehring sagt, daß nur die Anlage zu einer bestimmten Schädelform durch die Vererbung von den Eltern auf die Kinder übertragen wird; ob aber dieselbe Form bei den heranwachsenden Kindern wirklich zustande kommt, hänge wesentlich von den Ernährungsverhältnissen und den Einflüssen der Kopf- und Halsmuskulatur ab.

Die Tatsache, daß die Haltung in der Jugend allein den Ausschlag gibt, bekräftigen dahingehende Versuche von S. v. Nathusius. Die mangelhafte Ernährung in der Jugend gab der Schädelgestalt der Versuchstiere ihr dauerndes Gepräge. Trotzdem nach einem Jahr karger Haltung ein Versuchstier genau wie seine Wurfgeschwister reichlich weitergefüttert wurde, war der „Fehler“ in der Jugendernährung nicht wieder gut zu machen. Das früher karg ernährte Tier blieb kleiner und leichter und der Schädel behielt das gerade Profil bei.

Die verkürzte konkave Schädelform des Hauschweins bezeichnet H. v. Nathusius als eine Hemmungsbildung. Die Schädelform des jungen Wildschweins hat nämlich eine größere Ähnlichkeit mit dem Hauschwein als mit dem alten Wildschwein. Die Kopfform des Hauschweins ist also eine Entwicklungsstufe, welche gleichsam zwischen den Formen des jungen und alten Wildschweins liegt.

c) Auf Kiefer und Zähne.

Bei der Verkleinerung der einzelnen Schädelanteile halten nicht alle Komponenten gleichen Schritt. „Die einzige Dimension des Schädels, welche relativ konstant bleibt, ist die Länge der Backzahnreihe“, sagt N e h r i n g von einer domestizierten Rinderart. Nach H. v. N a t h u s i u s ist beim Schwein in den Kulturaffen die Reihe der Molaren gewöhnlich etwas kürzer im Verhältnis zu der Reihe der Prämolaren. Allgemein tritt hier auch an den Molaren eine stärkere Entwicklung der Nebenhöcker auf und eine starke Schmelzfältelung, die damit dem Zahn ein „komplizierteres Aussehen“ verleihen. Diese Schmelzfältelung sah Nathusius auch schon bei Wildschweinen, die in kultivierten Gegenden künstlich des Jagdbestandes wegen besonders gehegt und gefüttert wurden.

Der Durchbruch und Wechsel der Zähne erfolgt bei den Kulturaffen früher als beim gemeinen Landschwein oder gar beim Wildschwein. Je langsamer die Entwicklung bei einem Schwein ist, desto größer sind gewöhnlich die Zähne. Die relative Kleinheit der Zähne deutet auf Frühreife hin.

Beim gem. Landschwein laufen die Zahnreihen im Prämolaren- und Molarengebiet noch ebenso wie beim Wildschwein in einer zusammenhängenden Geraden und die beiderseitigen Zahnreihen sind fast parallel. Bei den Kulturaffen ist die Zahnreihe im Prämolaren- und Molarenabschnitt gebogen. B ä u m l e r bezeichnet diese S-förmige Krümmung als Stauchungskrümmung.

Der Zwischenkiefer ist beim Zahmschwein weniger schlank und die Schneidezähne sind mehr zusammengedrückt. Bei den Kulturaffen steht die Incisivpartie viel höher als die Backzahnreihe, da die Schnauze im vorderen Abschnitt aufwärts gebogen ist, während sie beim Wildschwein tiefer als diese steht. Der Unterkiefer erhält, wie schon erwähnt, dabei eine steilere Kinnsymphyse. Die unteren Schneidezähne sind steiler gestellt; sie erreichen aber trotzdem nicht mehr die oberen Zähne. Wir haben hier also einen regelrecht offenen Biß vor uns, die Eckzähne des Unterkiefers geraten in ihren intermaxillären Beziehungen zu den oberen hinter dieselben. Die Eckzähne selbst sind längst nicht mehr so stark entwickelt.

Bei allen domestizierten Schweinen erstreckt sich die Zahnreihe bis hinter die Orbita, während sie beim Wildschwein immer davor endet.

Bei den gefangenen Wölfen konnte W o l f g r a m ganz außerordentliche Stellungsabweichungen der Zähne nachweisen, so vor allem eine viel konvexere Zahnreihe. Im Prämolarenteil kam es zu Schachtelstellungen der Zähne infolge Platzmangels, während bei der Wildform hier ziemliche Zwischenräume, Interdentallücken bestehen. Der Gesichtsteil muß sich also gerade in diesem Abschnitt außerordentlich stark zurückgebildet haben, sonst wäre es nicht über die Einbuße der Lücken hinaus noch zur Kulissenstellung gekommen.

Für die starke Verkürzung spricht auch die Stellung des oberen Reißzahnes zur Augenhöhle. Während er bei der Wildform die Augenhöhle nicht erreicht, steht er bei den in Gefangenschaft geborenen Wölfen unter dem vorderen Augenhöhlenrand oder liegt sogar noch weiter distal.¹⁾ Dieser Zahn ist meist schon etwas verkleinert, noch mehr Variationen an Größe und Form zeigt der Nachbar dieses Zahnes der obere 1. Molar.

Nach H i l z h e i m e r bekommen alle Tiere in der Domestikation ein schwächeres Gebiß. Auch treten bei unseren Haustieren häufig Anomalien auf; von unseren Hunden sind viele solcher Bilder wie Distalbiß, Progenie, Engstand usw. beschrieben worden. F a b i a n hat in seinen „Merkmale und Grenzen in der Domestikationsfrage am Gebiß“ ein reiches Material hierüber gezeigt. Auch K i t t hat Formabweichungen und Veränderungen an Zahn und Gebiß besonders vom Pferd beschrieben.

A n d r e s e n stellte aufgrund von Röntgenaufnahmen bei einer Schweinegruppe, die mit ganzen Körnern aufgefüttert war, Zeichen von Hypertrophie des Paradentium infolge der Überfunktion fest. Die Zahnkeime der bleibenden Zähne sind hier stark entwickelt und mineralisiert. Bei der Gruppe, die aufgeweichtes

¹⁾ Eine sehr anschauliche Abbildung von der Einstellung des Raubzahnes zur Augenhöhle bei freilebenden Caniden und bei Haushunden hat uns V i g g o A n d r e s e n in den Fortschr. d. Orthodontik 1931/2 gegeben.

Schrot erhielt, waren die Knochen am schlechtesten entwickelt und mineralisiert, ebenso die Zahnkeime. Durch die schlechtere Mineralisation der Zähne ist auch eine gewisse Disposition zur Karies bei unseren Haustieren gegeben. Dazu leidet durch die andere Ernährungsweise auch die Selbstreinigung des Gebisses. Wenn aber die Karies und Hypoplasien doch verhältnismäßig selten vorkommen, so ist wohl der frühe Beginn der Zahnentwicklung daran schuld, wobei schädigende Einflüsse sich noch nicht geltend machen. Nach Fabian liegen aber vielleicht auch zuweilen günstigere Bedingungen für die Zahnentwicklung in der Domestikation vor. Auch in der freien Natur sind Karies und Hypoplasien anzutreffen, allerdings nur ganz selten, noch feltener Zerstörungen am Zahnfach. Dagegen wird man Zerstörungen durch Bruch an Zähnen oder Schädigungen durch Verletzungen häufiger finden.

B. Beim Menschen.

1. Einflüsse auf den Gesamtkörper.

Wie zu Anfang erwähnt, hatte schon Hahn geäußert, auch der Mensch sei von den Gesetzen der Domestikation berührt worden. E. Fischer, der sich mit der Domestikationsfrage beim Menschen besonders eingehend beschäftigt hat, glaubt die Frage, ob der Mensch als eine domestizierte Form zu betrachten sei, bejahen zu können. „Der Mensch ist eine Domestikationsform,“ so schreibt er, „und Domestikation ist es, die seine starke Variabilität verursacht oder mitverursacht.“ Nach ihm sind alle menschlichen Gruppen schon seit langem als domestiziert aufzufassen, schon seit der Zeit, wo wir überhaupt vom Menschen sprechen, wo der Mensch beginnt, das Feuer zu benutzen, wo er noch in organisierten Horden lebte, da er schon auf dieser Stufe willkürlich seine Ernährungs- und Fortpflanzungsverhältnisse beeinflusste. Somit sind auch die primitivsten Völker schon als domestiziert zu betrachten.

Zwischen Mensch und Tier besteht hinsichtlich der Domestikationsfrage der Unterschied, daß der Mensch dem Haustier ein neues Milieu aufzwang, während der Mensch sich durch eigene Überlegung in ein solches einpaßte. Deshalb erscheint es Weiden-

reich nicht ganz gerechtfertigt, beim Menschen von Domestikation zu sprechen. In den Worten „Zivilisation“ und „Kultur“ hätten wir eine bessere Ausdrucksweise, um gleichzeitig auch den Grad des Domestiziertseins zu präzisieren.

Alle Merkmale, die beim Menschen als Rassenunterschiede vorkommen, treten nach E. Fischer als solche auch bei den Haustierrassen auf und umgekehrt, die meisten Haustierbesonderheiten finde man beim Menschen als Rasseneigenheit wieder. Wenn einige Erscheinungen fehlen, so finde man bei den Tieren ja auch nicht alle Eigentümlichkeiten bei einer Species. Dem Menschen fehle eigentlich nur die Variabilität der Ohrmuschel und die Fleckung; alle anderen Eigenschaften treten vollkommen parallel in Erscheinung.

Paulsen will nicht soweit gehen wie E. Fischer, alle Rassenmerkmale als Haustiereigenschaft aufzufassen. Beim nichtdomestizierten Menschen müßten schon Rassenunterschiede bestanden haben, die man als Natur- oder Urrassen bezeichnen kann. Eine Anzahl von Merkmalen verdanke ihre Entstehung der Domestikation, die eine starke Veränderung des Wechselspiels der endokrinen Drüsen hervorrufe. Solche Rassen — wohl die Mehrzahl — könne man als sekundäre Rassen, als Domestikationsrassen oder Kulturrassen bezeichnen. Sekundäre Merkmale besäßen vermutlich alle Rassen.

Nach Hruska ist der Mensch selbst eine reine Domestikationsform. Er lebt in und durch die Domestikation und er ist an sie in jeder Hinsicht angepaßt.

Hahn glaubte die Farbe der Haut und die Nacktheit der Haut als Haustiereigenschaft auffassen zu können. Fischer will nicht in der Nacktheit ein Domestikationszeichen sehen, wohl aber in den Schwankungen in der menschlichen Behaarung, besonders in der Dichtheit und Länge des Haupthaars, aber auch in der Haarform; so treten als typisch u. a. Welligkeit und Lockung oder die Kraushaarbildung der Neger, die aber auch spontan bei anderen Rassen erscheint, auf.¹⁾

¹⁾ Inbezug auf die Erscheinung von „Haarmenschen“ macht Hruska darauf aufmerksam, daß es viel näher liege, diese Erscheinung als eine konstitutionelle Anomalie im Sinne einer Domestikationsentartung aufzufassen, als sie etwa als Rückschlags-

Weiter glaubt F i s c h e r auch, daß die europäischen Rassen verschiedene Abstufungen von Domestikationsalbinismus zeigen, indem er das Hellsein der betreffenden Menschen als eine Parallelerscheinung des Domestikationsalbinismus bei weißen und hellen Haustieren annimmt. Dementsprechend faßt er die Hautfarbe vieler Neger als melanotische Domestikationsform auf. Den Einwand, die helle Farbe der nördl. Breite sei vielleicht mit der hellen Farbe der Polartiere zu vergleichen, glaubt F i s c h e r durch die Depigmentationserscheinungen im Auge des Europäers und der Haustiere, aber auch durch die Tatsache des Auftretens von partiellem Albinismus bei allen Menschengruppen widerlegen zu können. Bei allen Farbigem tritt nämlich spontan Blondheit und hellere Hautfarbe auf. Natürlich gehen diese Menschen meist infolge ihrer Unangepaßtheit an die Tropen zugrunde. Es könne aber nicht zweifelhaft sein, daß man aus solchen Negern eine entsprechende Rasse künstlich züchten könne, weil die Erscheinung sich konstant vererbt. Die Blondheit und Helläugigkeit der europäischen Rassen kann daher also als Domestikationsercheinung aufgefaßt werden.

Neben der einseitig hellen oder dunkleren Haut gibt es auch gar nicht allzu selten gefleckte Individuen, wie Elsterneger und Tigermenschen. F i s c h e r zeigt in seiner Abhandlung eine Abbildung eines halbalbinotisch gefleckten Mädchens.

Ferner kann man die Neigung zum Fettanfaß als ein weiteres Domestikationszeichen ansehen.

Die Steatopygie, die eigenartige Bildung des Hottentotensteißes kann als Beispiel des partiellen Fettanfaßes (wie bei Buckelrindern oder Steißschafen) dienen.

Das Auftreten von Zwergrassen hat ebenfalls seine Parallele in den Haustierzwergrassen. Auffallend große Menschen erinnern demgegenüber an Riesenwuchs.

erscheinung, als Atavismus, zu betrachten. Diese Erscheinung ist nämlich meist mit einer mangelnden Gebißanlage verbunden; phylogenetisch spielen aber in der menschl. Vorfahrenreihe irgendeine zahnlose Form wohl keine Rolle.

Paulsen schreibt, daß man alle Völker, die mit den jetzigen Geschlechtern verglichen, in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten in ihren Maßen durchschnittlich größer geworden sind, gleichsam als Kümmerformen ansehen könne. Das gelte auch für die Ritter des Mittelalters (deren Panzer für die heutigen Menschen zu klein sind), wie auch für die Menschen der prähistorischen Zeit. Die Lebensbedingungen seien eben früher nicht so günstig gewesen, daß sie die vollen, rassenmäßig möglichen Maße erreichten.

Eine weitere interessante Untersuchung über die Körpergröße ist u. a. die Bolk'sche, an niederländischen Rekruten aus verschiedenen Jahrzehnten. „Sind die äußeren Lebensbedingungen schlecht,“ so schreibt Bolk, „dann verringert sich die Körperlänge, verbessern sich... die Lebensbedingungen, dann tritt eine Zunahme der Körpergröße ein.“

Können wir uns eine bessere Übereinstimmung mit der Ansicht Nehrings über den Domestikationseinfluß auf die Körpergröße vorstellen?!

2. Einflüsse auf den Schädel.

a) Auf Hirn- und Gesichtschädel.

Die Domestikationsercheinungen am Menschen zu analysieren, hat gegenüber den Tieren durch das fehlende morphologische Vergleichsobjekt der Wildform ihre Schwierigkeiten. Die heute lebenden primitiven Formen des Menschen sind schon als domestiziert zu erachten, und da, wie Weidenreich betont, auch die Reste fossiler Hominiden schon bestimmte Zeichen einer Rassenbildung besitzen, ist es nicht möglich, irgendeine bestimmte Wildform des Menschen als Grundlage eines Vergleichs zu nehmen. Weidenreich setzt daher den Schädel des Menschen in Parallele zum Primatenschädel, um daraus Domestikationsmerkmale folgern zu können. Gegenüber dem Anthropomorphenschädel, der seine Wachstumsproportionen nach der Geburt bedeutend ändert, behält der Mensch im wesentlichen die des fötalen Zustandes bei. Beim Anthropomorphen erreicht der Gehirnschädel schon im zweiten Le-

bensjahr seine endgültige Größe und zwar lange bevor die Zahnentwicklung abgeschlossen ist. Beim Menschen dagegen tritt dies erst im dritten Lebensdezennium ein. In der Beibehaltung der fötalen Wachstumsverhältnisse beim Menschen erblickt er entgegen Bolk keine Hemmungsbildung, da diese durch das propulsive Wachstum des menschlichen Gehirns in der postfoetalen Periode bedingt seien.

Im Hinblick auf die etwaigen Schädelveränderungen beim Menschen infolge der Domestikation sagt E. Fischer, müßten wir erst weiter sein, um Sicheres sagen zu können. Gleichwie Klatt eine Zunahme des Stirnhirns beim Hund infolge der Domestikation feststellte, müßte man auch beim Menschen Schädel daraufhin untersuchen. Er glaubt auch die deutlich verschiedene Rassenbegabung als Domestikationsprodukt auffassen zu können.

Broca will an einer Reihe von Schädeln infolge der Kultur und der hierdurch erhöhten Intelligenz eine Zunahme der Schädelkapazität festgestellt haben.

Retzius tritt dieser Ansicht allerdings entgegen, indem er durch Untersuchungen an Schädeln aus Schweden — wo die Population kaum von fremden Einflüssen und Einwanderung beeinflusst worden ist — folgert, daß es bis jetzt keinen Beweis für die von Broca aufgestellte Theorie gebe, daß die Größe der menschlichen Schädelhöhle bzw. das Gehirn durch die Einwirkung einer erhöhten Kultur wächst; denn aus seinem Schädelmaterial, das aus verschiedenen Perioden stammt, gehe keine wesentliche Veränderung in der Größe der Schädelhöhle hervor, sondern es seien lediglich nur die gewöhnlichen Variationen der Größe in einem ungefähr gleichen Umfang nachzuweisen. Schon im Steinzeitalter und Eisenzeitalter scheine nach seinem Material die Schädelhöhle bzw. das Gehirn eine ebenso hohe Ausbildung erhalten zu haben, wie sie auch in der neueren Zeit und jetzt vorhanden ist.

E. Fischer weist auch auf die dringende Forderung hin, durch Untersuchungen die Umweltwirkungen auf den Menschen festzustellen, wie das etwa Boas in einem Falle getan habe.

Boas hatte Veränderungen bei Nachkommen von Einwandern in Amerika festgestellt und kam zu dem Schlusse, daß z. B.

die Nachkommen von osteuropäischen, brachycephalen Juden, langköpfiger, Nachkommen von stark dolichocephalen Süditalienern kurzköpfiger wurden, sodaß beide Typen, was die Kopf-form betrifft, sich einem gleichen Typus nähere.

b) Auf Kiefer und Zähne.

Fabian erinnert daran, wie sehr der menschliche Schädel und insbesondere sein Kauapparat den Einflüssen der Domestikation unterworfen ist. So sehen wir z. B. in dem Zurückweichen des Gebisses unter den Hirnschädel beim Kulturmenschen gegenüber den primitiven noch nicht so stark domestizierten Rassen, (deren Kauorgan noch prognathe Tendenz aufweist), eine Antwort für die geringere Inanspruchnahme des Kauorgans. Damit ergeben sich konsekutiv auch Umgestaltungen für den umgebenden Gesichtschädel.

Die Hauptmerkmale der Schädel aus ältester vorgeschichtlicher Zeit sind das auffallend niedrige Schädeldach, die fliehende Stirn und die mächtigen Augenbrauenwülste. Die Augenhöhlen sind weit und groß und die knöcherne Nasenöffnung fast kreisrund. Der Unterkiefer ist kinnlos; die Kiefer sind prognath; die Frontzähne, besonders die unteren stehen schräg nach außen. Das gibt dem Gesichtschädel ein schnauzenförmiges Aussehen.

Gegenüber den heutigen Menschen sind die Veränderungen so groß, daß Walkhoff besonders inbezug auf das Kauorgan sagt: „Was zur Diluvialzeit der normale Typus der Kiefer- und Zahnform war, würde bei heutigem Vorkommen für schwerste Anomalie erklärt werden müssen und ebenso kennt man noch keinen altdiluvialen Fund mit den Formen der Kiefer und Zähne des heutigen Kulturmenschen.“ Die typischen Eigenschaften des altdiluvialen Kauorgans stehen damit im vollen Gegensatz zu dem heutigen Typus, so vor allem die starke Prognathie der Kiefer und Zähne, die mächtige Entwicklung der gesamten Kieferknochen, das fehlende Kinn, die außerordentliche Größe der labiolingualen Durchmesser der Vorderzähne sowie auch die allgemeine Größe sämtlicher Zähne. Der Weisheitszahn war meist noch größer als die übrigen Molaren.

Die Vorderzähne zeigten eine starke Rückwärtsverkrümmung der Wurzeln. Während allmählich diese Zähne sich immer mehr senkrecht einstellen, tritt nunmehr die immer stärker werdende Ausprägung des Kinns hervor. Zuerst trafen sich die Vorderzähne noch im Kopfbiß, aber schon von den Abschnitten der jüngeren Altsteinzeit an kommt es langsam zu einem leichten Überbiß. In der ältesten Epoche hatte der Zahnbogen noch eine hufeisenförmige Gestalt. Der Unterkiefer bekommt nach und nach Parabelform und im Oberkiefer bildet sich die Eliptenform aus.

Diese Reduktion der menschlichen Kiefer und Zähne wird nach Wal k h o f f durch den „konstant geringer gewordenen Gebrauch“ des Gebisses, wie er durch die immer größer werdenden Kulturerrungenschaften in Gestalt der besser schneidenden Werkzeuge und durch die der Nahrungsaufnahme vorausgegangene Zerkleinerung und Zubereitung der festen Nahrungsmittel durch Mühle und Feuer bedingt ist, hervorgerufen.

Beim hochdomestizierten Europäer ist das Gebiß sogar in einer weiteren Reduktion begriffen, indem das Gebiß einer Form zustrebt, der die Elimination einzelner Zähne zugrunde liegt und zwar der dritten Molaren, der seitlichen Schneidezähne und der zweiten Praemolaren — jedesmal des letzten Zahnes in der betreffenden Zahngruppe. Beim heutigen Europäergebiß kann man diese Rückbildung in allen Stufen verfolgen, angefangen von der fast noch vollwertigen aber schon stark verkleinerten Form, über die oft schon schmelzarmen, bald aber schon schmelzlosen Kegel- und Zapfenform bis hin zur völligen Elimination.

Der heutige Kultur Mensch neigt zu zahlreichen Zahnanomalien in Stellung, Größe, Form und Struktur. Durch die Reduktion, bei der die Kiefer und Zähne nicht gleichen Schritt zu halten brauchen, erklären sich manche Anomalien, besonders die der Engstellung und der Kompressionen. Die häufig zu beobachtende Prognathie des Oberkiefers (soweit sie nicht durch individuelle Einflüsse [Damenlutschen usw.] bedingt ist), ist, wie Wal k h o f f hervorhebt, auf die stärkere Reduktion des Unterkiefers zurückzuführen, ebenso der tiefe Biß der unteren Schneidezähne hinter die oberen, nicht zuletzt aber auch die heute so häufig vorkommende Distal-

verschiebung der Unterkieferzahnreihe, sofern sie nicht durch schlechte Funktion und Beanspruchung (frühzeitige Zerstörung der Milchmolaren usw.) ausgelöst ist.

Walckhoff schreibt: „Alle Anomalien, wie solche der Stellung der Form, Größe und Struktur sind, soweit nicht wieder individuelle Einflüsse sie erzeugen, nur der Ausdruck der Wirkung äußerer Faktoren insbesondere der konstant geringer gewordene Gebrauch auf die Kiefer und Zähne seiner Vorfahren.“

So ordnen sich also zahlreiche Anomalien der Zahnstellung und der Kieferform leicht unter den Begriff der Domestikationseinflüsse, für die wir auch oft eine Parallele in der Tierwelt finden. Korkhaus weist in seiner Ätiologie der Zahnstellungs- und Kieferanomalien darauf hin, daß man den Kieferanomalien beim Tier deshalb größeres Interesse schenken sollte als bisher, „zumal Züchtungsexperimente die Frage einer erblichen Fixierung oder Disposition klären und auch Umweltseinflüsse jeder Art eingesetzt und in ihren Auswirkungen beobachtet werden können.“

Auch Fabian gibt uns zahlreiche Belege für die Entstehung der Anomalien auf domestikaler Basis, doch warnt er davor, einfach alle Anomalien unter den Begriff der Domestikation zu fassen. Manche Frage harre noch der Lösung, für die es auch nicht ohne weiteres eine Parallele in der Tierwelt gebe. So spielten u. a. üble Angewohnheiten oder Krankheiten eine Rolle. Manche Anomalie der Kieferform und Zahnstellung bedürfe daher im einzelnen noch weiterer Klärung. Daher begrüßt er den aufklärungsreichen Weg, den Korkhaus zur Erforschung mancher Anomalien eingeschlagen hat, Beginn und Ablauf der einzelnen Anomalien vom Säugling an zu verfolgen und zu kontrollieren. Dazu kommen auch schon Ergebnisse der Zwillingsforschung für manche aufschlußreiche Klarstellung.

Neben den Anomalien findet man in dem Rahmen der domestikalen Schädigungen für den Menschen vor allem drei weitere Erscheinungen, die Karies, die Paradentose und die Dentitio difficilis.

In der vorgeschichtlichen Zeit war die fast überstarke Abkautung des Gebisses charakteristisch. Der Mensch mußte seine Kau-

werkzeuge in starkem Maße beanspruchen. In dieser Zeit zeigte sich selten Karies, ging aber jedenfalls nie von der Kaufläche aus (es sei denn, daß der Antagonist verloren gegangen war) (Euler). „Hand in Hand mit dem Nachlassen der Kautätigkeit nimmt die Zahl der an Karies erkrankten Menschen und der kariösen Zähne zu“ (Werner). In der geschichtlichen Zeit war bis ins 13. Jahrhundert die Kariesanfälligkeit noch gering, stieg dann bis zum 17. Jahrhundert, von wo aus ein besonders starker Anstieg bis zur heutigen Kariesfrequenz zu verzeichnen ist. Dieser Anstieg ist nach neueren Untersuchungen zum größten Teil durch die erhöhte Kultur, insbesondere durch die veränderte Ernährungsweise (Hochmüllerei, verfeinerte Kochkunst usw.) bedingt. Charakteristisch für die Zunahme der Karies ist die heute bis zu einem Drittel beteiligte Häufigkeit der Karies an den Frontzähnen, die bis zum 17. Jahrhundert an diesen Zähnen äußerst selten vorkam. Nach Untersuchungen Eulers waren früher die bleibenden Zähne in den ersten 2 Jahrzehnten im allgemeinen kariesfrei, während sie heute zu 80% beteiligt sind.

Nach neueren Untersuchungen Proells kommen Zahnschäden auch bei primitiven Völkern, wenn auch in geringem Grade vor. Nach ihm zeichnen sich alle naturgebundenen Primitiven, d. h. Naturvölker (nomadisierende Bewohner des grönländischen und sibirisch-asiatischen Binnenlandes, des Inneren von Mittelfrika und Südamerika sowie der australischen Inselgruppen) durch ihre eiserne Gesundheit und durch die besonders gut ausgebildeten, gefunden Kiefer und Zähne aus. Aber schon eine geringe Abkehr vom naturgemäßen Leben, z. B. das Sesshaftwerden, wirkt sich auf die Widerstandskraft der harten Zahnsubstanzen aus, wie Proell aufgrund seiner Forschungsergebnisse an der südafrikanischen Population beweisen konnte. „Bedrohlich wirkt sich indes,“ so schreibt derselbe Forscher, „der plötzliche Übergang eines Volkes in eine höhere Zivilisationsstufe, sowie überfeinerte Sitten und das Großstadtleben aus. Unsere Landbevölkerung lebt in der Überzivilisation und hat darum keine besseren Zähne als die Städter.“

Was von der Karies gesagt wurde, das gilt ebenso von der Parodontose. Hruska sieht in dieser Krankheit eine ererbte Debität des vasomotorischen Systems am Kauorgan, die eine Domestikationsfolge regressiven und degenerativen Charakters sei. Klusmann hebt hervor, daß die zu weiche Nahrung zur Unterfunktion des Kauorgans führe. Dadurch leidet die Selbstreinigung des Gebisses, womit die Kariesgefahr erhöht wird. Gleichzeitig aber übt diese Unterfunktion einen zu geringen Reiz auf das Parodontium aus und führt dadurch zu einer mangelhaften Durchblutung der Umgebung des Zahnes; damit ist aber eine günstige Vorbedingung für die Parodontose geschaffen.

Durch die Reduktion und durch die Unterfunktion erklären sich auch die Durchbruchschwierigkeiten der Weisheitszähne. Bis in neuere Zeit waren diese Schwierigkeiten nicht zu beobachten. Diese kamen, wie Werner auf grund seiner Untersuchungen erklärt, weder in der Jungsteinzeit noch beim Menschen des 16. und 17. Jahrhunderts vor. Durch die geringe Anforderung an die Kauleistung der Front- und Mahlzähne sei es nicht verwunderlich, wenn der Raum hinter den zweiten Molaren immer mehr beschränkt wird, sodaß die Weisheitszähne am Durchbruch gehindert sind. Ja die Zahnkeime gelangen zum Teil schon nicht mehr an den ihnen zugedachten Platz und bleiben im Kieferast liegen.

C. Eigene Untersuchungen: Vergleich von Farm- und Wildfuchsen.

1. Aufgabe, Material und Methodik der Untersuchungen.

Im folgenden soll nun untersucht werden, ob und in welchem Maße Farmfuchse, wie sie auf Pelztierfarmen gehalten werden, durch die Gefangenschaft Veränderungen erleiden. Zu diesem Zwecke wurden 20 Farmfuchschädel und 20 Wildfuchschädel einer näheren Untersuchung unterzogen. Die Messungen erfolgten im Korkhaus'schen Symmetrographen, welcher für Gebißmessungen zu orthodontischen Zwecken gebraucht wird, und der sich für diesen Zweck ebenfalls sehr gut verwenden ließ. Das Einspannen der Schädel erfolgte in ein Ebenensystem, wobei die Median-, die Horizontal- und die Frontalebene zu einander senkrecht standen. Dabei war die Medianebene durch das Basion, das Nasion und das Staphylion, der Basis des Apparates parallel laufend, festgelegt. Die Horizontalebene war durch die senkrechte Lage zu der Medianebene, durch ein Porion (links) und durch das Nasospinale fixiert, während die Frontalebene durch das Porion und die senkrechte Lage zu der Median- und Horizontalebene sich ergab. Die drei Ebenen gehen somit durch den Biporialpunkt, der der Nullpunkt für sämtliche 3 Messungen war.

Von den untersuchten Wildschädeln waren 9 männlichen und 10 weiblichen Geschlechts, während bei einem Schädel das Geschlecht nicht angegeben war. Dieser Schädel war aber deshalb besonders wertvoll, weil es sich um den Schädel eines jugendlichen Tieres handelte, bei dem der Zahnwechsel noch nicht vollendet war. Bei den anderen Schädeln war die Dentition abgeschlossen, bei einigen Tieren lassen die Nahtverwachungen des Schädels und die Schliffflächen der teilweise stark abgekauten Zähne auf ältere Tiere schließen. Alle diese Tiere stammten aus freier Wildbahn Deutschlands, vorwiegend aus dem Rheinland. Das Farmschädelmaterial setzte sich aus 14 männlichen und 6 weiblichen Tieren zusammen. Das Alter belief sich von 9 Monaten bis zu 4 Jahren. Außerdem

wurde noch ein Schädel eines im Zoo geborenen Tieres untersucht und gelegentlich zum Vergleich herangezogen.


Die Farmfüchse, deren Vorfahren aus Kanada stammen, waren Silberfüchse aus einer Fuchsfarm im Rheinland. Daß die Vorfahren dieser Tiere von einem anderen Kontinent stammen, mag zunächst stutzig machen und die Berechtigung absprechen, Tiere von so entfernter geographischer Lage mit einander vergleichen zu dürfen. Dieser Einwand ist natürlich berechtigt; aber es handelt sich um dieselbe Art *vulpes alopes* und die Silberfüchse bilden nicht einmal eine Unterklasse. *Richardson* erklärt nach *Blasius*, daß man die Füchse der Westküste Amerikas und der südl. Vereinigten Staaten nicht von unsern Füchsen unterscheiden könne. *Wolfgang* erwähnt allerdings, daß es sich bei den nordamerikanischen Füchsen wahrscheinlich um etwas größere Tiere handelt.

Verrät aber nicht das Haarkleid, daß es sich um andere Tiere handeln muß? Darauf ist zu antworten, daß der Silberfuchs nur eine Farbvarietät des Rotfuchses ist, die spontan entsteht und als solche weiterzchtet; sie ist vielleicht geographisch bedingt, sie kommt in Nordamerika und in Kleinasien vor. Unsere deutschen Weidmänner unterscheiden ja selbst unter den deutschen Füchsen schon zwei Farbvarietäten, den Birkfuchs, der lebhaft rot gefärbt ist mit weißer Kehle und weißer Schwanzspitze, und den Brandfuchs mit einem mattfarbigen, wie mit Ruß bestreut oder angefengt aussehenden Fell, mit grauer Kehle und schwarzer Schwanzspitze. Das sind eben auch Farbvarietäten, und um eine ähnliche handelt es sich bei dem Silberfuchs, der also frei in Europa nicht vorkommt. Vom Fuchs ist bekannt, daß er in nördlichen Gegenden am besten gedeiht, daß er, je weiter wir nach Süden gehen, kleiner und schwächer wird. In flachen Gegenden gedeiht er nicht so gut wie in bergigen Geländen. Je rauher das Klima ist, umso besser sagt es ihm zu; es ist ähnlich, wie es *Nehring* auch vom Wolf geschildert hat.

Auch insofern dürfte ein Vergleich dieser kanadischen Tiere statthaft sein, als sie einem Lande entstammen, das im Süden unsere geographische Breite und dort ein ähnliches Klima besitzt.


Brehm charakterisiert den Kopf des Wildfuchses als breitköpfig mit platter Stirn; die Schnauze, die sich plötzlich verschmä-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----



IX: 6 1 1 1

- der (linken) äußeren Gehör-
deren Mitte.
am Vorderrand des Foram.
oralster Punkt am vorderen
senkrecht unter dem Biporion.
hfter Punkt in der Mediane
Kranz- und Pfeilnaht.
ten nach hinten vorspringende,
Punkt des Hirnschädels.
riften ausladende und tiefste
ks).



Co = Coronale, höchster Punkt an dem Temporalflügel des Keilbeins an der Kranznaht (links).

Eg = Einschnürung, medianster Punkt der Schläfengrube des Stirnbeins hinter und in der Höhe des Proc. Postorbitalis (links).

Pb = Spina des Proc. Postorbitalis (links).

Ph = Höhe über Proc. Postorb., höchster Punkt des Stirnbeins senkrecht über dem Proc. Postorb. (links).

II. Maßpunkte am Gesichtsfchädel.

Pr = Prosthion, der am meisten vorragende mediane Punkt am Oberrand des Alveolarfortsatzes zwischen den beiden oberen medialen Incisiven.

Ns = Nasospinale, medianer vorderster höchstgelegener Punkt an der Basis des Naseneingangs.

Sp = Nasenspitze, am meisten vorragender medianer Punkt des Os nasale.

Nb = Nasenbugpunkt, tiefster Punkt am Nasenbug in der Medianlinie.

N = Nasion, Nasenwurzel, Kreuzungspunkt der Stirn-nasennaht.

Smt = höchster und aboralster Punkt der Sutura maxillofrontalis (links).

Ma = medianster Punkt am (linken) Augenrand.

Va = Vorderaugenpunkt, oralster Punkt am (linken) Augenrand.

Or = Orbitale, tiefster Punkt am unteren (linken) Orbitalrand.

Zy = Zygon, der am meisten lateral ausladende Punkt des (linken) Jochbogens.

III. Maßpunkte am Ober- und Unterkiefer.

Pr = Prosthion, der am meisten vorragende Punkt am Oberrand des Alveolarfortsatzes zwischen den beiden oberen medialen Incisiven.

JM = Incisiv.-Maxillarpunkt, der ausladendste Punkt der Sutura Icisivo-maxillare (links).

W = Wurzelpunkt des Reißzahns, oralster und bukalster Punkt an der Schmelzzementgrenze des (linken) oberen Reißzahnes.

Rsp = Spitze des Reißzahnes (ob. links).

Gbr = breitesten Gesichtspunkt, die am weitesten ausladende Stelle des Os maxillare (am Alveolarrand) (links).

Tu = Tuber, distalster Punkt des Os maxillare am Alveolarfortsatz (links).

St = Staphylion, medianer Punkt nahe dem Hinterrand des Os palatinum, welcher durch eine die tiefsten Auschnitte des Gaumenhinterrandes verbindende Gerade getroffen wird.

Gm = Gaumenbein, mesialster Punkt des Os palatinum in der Mediane.

Id = Infradentale, der am meisten vorragende Punkt am äußeren Alveolarrand zwischen den mittleren Unterkiefer Schneidezähnen.

Fm₁ = For. mentale 1, distalster Punkt an der Umrandung des vorderen For. mentale (links).

tUk = tiefster Punkt an der Unterkieferbasis (links)

Go = Gonion, tiefster Punkt am U.K. senkr. unter dem Tuber (links)

PrA = Proc. angularis, Spitze des Proc. angul. (links).

2. Die Befunde.

a) am Hirnschädel.

Wenn man die Schädel der Wild- und Farmfuchse betrachtet, so fällt schon rein äußerlich der mehr abgerundete und gewölbte Hirnschädel der Farmtiere auf. Bei diesen Farmtieren fehlt der Aufbau in Form der Sagittalkämme, die bei mehreren Wildtieren schön ausgeprägt sind. Wenn sich auch nicht bei allen Wildfüchsen ein Sagittalkamm gebildet hat, so ist bei diesen Tieren doch die linea temporalis im allgemeinen deutlicher gezeichnet. Der Hirnschädel der Wildtiere macht einen mehr abgekanteten Eindruck. Bei den Wildtieren, besonders jenen, die einen Sagittalkamm haben, ist die Knochenoberfläche in der Schläfengrube eine rauhere, während bei den Farmtieren diese sich viel glatter verhält.

Für die Höhe des Hirnschädels findet man zwar nach den Messungen für die Wild- und Farmtiere ein fast absolut gleiches Durchschnittsmaß (W: 3,59 cm, F: 3,62 cm). Dabei besteht auch in den Durchschnittsmaßen aus den Gruppen der weiblichen und männlichen Tiere kein wesentlicher Unterschied, obschon diese Gruppen in der Schädel länge (Nasospinale — Biporion) immerhin merkliche Unterschiede zeigen. Diese Ohrschädelhöhe schwankt nun bei den Wildschädeln etwas stärker nämlich um 0,5 cm von 3,35—3,85 cm, während die Farmtiere nur um 0,3 cm schwanken. Die Farmfuchse erreichen das Maximum 3,85 cm ihrer Partner nicht ganz, haben aber in 3,5 cm schon ihr Minimum, das die Wildschädel erst in 3,35 cm erreichen.¹⁾

Beachtet man, daß mehrere Wildschädel — meist sind es die großen — mit einer Crista sagittalis versehen sind, die in der Gegend des Ohrschädelhöhenpunktes, bis zu 0,3 cm stark fein kann, und mitgemessen wurde, so unterstreicht das die relativ größere Höhe des Hirnschädels bei den Farmtieren; denn diese Crista ist an sich als ein späterer funktioneller Zuwachs und als Aufbau zum Hirn-

¹⁾ $M_W = 3,58 \pm 0,03$ cm, $M_F = 3,62 \pm 0,017$ cm (M_W = Mittelwert und mittlerer Fehler des Mittelwertes, bei den Wildfüchsen, M_F dasselbe bei den Farmfüchsen).

schädel zu werten; während diese Kammbildungen den Farmfüchsen fehlen, erreichen sie doch die Ohrschädelhöhe der Wildtiere völlig.

In den Abbildungen (Seitenansicht) zeigt der größte Wildschädel nur dieselbe Höhe 3,8 cm wie der größte Farmschädel, obgleich er in der Schädellänge (Nsp.-Bipor.) 1,05 cm größer ist. Bei den kleinen Schädeln der Abb. beträgt die Höhe 0,25 cm für den Farmschädel mehr (bei fast gleicher Basislänge, Nsp.-Bipor.).

Da nun die Farmtiere in der durchschnittlichen Schädellänge (Nsp.-Bipor.) kleiner sind, erhebt sich die Frage, ob vielleicht der höhere Schädel ein Attribut des kleineren Schädels ist. Das kann man aber bei Betrachtung der Werte für die Wildschädel keineswegs sagen. Eines aber kann uns hier vielleicht Auskunft geben. Wenn man den Wert des jungen Wildfuchses W₁₀ einmal mit den Werten anderer Schädel von annähernd gleicher Basislänge (Nsp.-Bipor.) vergleicht, so erweist sich ersterer als höher. Der einzige Schädel, der ihm in dieser Höhe gleichkommt, ist W₄, der aber in der Länge ihn um 1,0 cm übertrifft. Mit diesem Schädel teilt er das Maximum der Höhe. Schädel W₄ aber besitzt ein ca. 3 mm starke Crista sagittalis. Eine solche fehlt dem jugendlichen Schädel noch ganz. Ja selbst die Temporalislinie ist bei diesem Schädel noch nicht markant gebildet, sondern nur schwach angedeutet verläuft sie, was sonst kein Schädel zeigt, beiderseits in doppelten Linien, indem der Muskel im Ansatz also schon höher steigt.

Es liegt hier der Gedanke nahe, daß dieses höhere Maß mit samt der noch abgerundeteren Form des Hirnschädels ein jugendliches Merkmal ist, indem es der Ausdruck der noch geringeren Kaumuskelfaltung ist. Die machtvollere Entwicklung des M. temporalis wird den jetzt noch abgerundeteren Hirnschädel später abflachen, ihn kantiger gestalten, ihn einschnüren (Schläfengrube), um später bei noch größerem Flächenbedarf, wenn die Muskelansätze die Mediane erreicht haben, einen Kamm zu bilden.

Somit kann wohl die relativ größere Höhe des Hirnschädels bei den Farmtieren sowie der abgerundete Charakter der Kapselform ebenso als ein Ausdruck der Beibehaltung eines jugendlichen Merkmals aufgefaßt werden, bedingt durch die geringere Kaumuskelfbeanspruchung infolge einer anderen Ernährungsweise. (Die Tiere

erhalten nämlich meist eine gekochte, pflanzliche Nahrung, die weniger Anforderungen an den Kauapparat stellt.)

Ähnlich wie die Ohrschädelhöhe verhält sich auch die Höhe des Bregmas über der Horizontalebene. Diese zeigt fast dieselben Maße wie die Ohrschädelhöhe an. Natürlich liegt dieser Punkt gemäß der verschiedenen Länge der Schädelgruppen sagittal schon etwas anders von der Porionebene entfernt.

Im Gegensatz zu den Befunden der Höhe über dem Porion und im Bregma erweist sich die Höhe des Opisthokraniums über der Horizontalebene anders. Trotzdem dieser Punkt sagittal fast gleichweit in beiden Gruppen von der Porionebene entfernt liegt, erreicht er in der Höhe bei den Farmfüchsen durchschnittlich ein um 0,29 cm geringeres Maß.²⁾ Dieser Punkt liegt also für die Wildfüchse höher. Zieht man Vergleichschädel heran (das sind Schädel von etwa gleicher Basislänge und gleichem Geschlecht aus den beiden Schädelkategorien) so sieht man, daß allgemein die Farmschädel von dem Ohrschädelhöhenpunkt nach dem Opisthokranium tiefer und steiler abfallen. (Vgl. auch Abbildungen.) Verbindet man diese Punkte durch eine Gerade, so erhält man in dem Winkel, den diese Verbindungslinie mit der Ohrschädelhöhe bildet, bei den Wildfüchsen den Mittelwert 65° , bei den Farmfüchsen nur etwa 58° .

Zieht man in diese Betrachtung des Opisthokraniums noch einen Punkt hinein, den Punkt der größten Breite an der Hinterecke des os temporale, — dieser Punkt ist der am meisten transversal ausladende und zugleich vertikal am tiefsten liegende Punkt der linea nuchalis —, so haben hier die Wildtiere ein breiteres Durchschnitsmaß 2,4 cm gegenüber 2,25 cm³⁾ bei den Farmfüchsen. Mit diesem breiteren Maß der Temporalecken und mit dem zugleich höher liegenden Opisthokranium besitzen die Wildtiere in der Fläche Temporalisecke links — Opisthokranium — Temporalisecke rechts eine größere Ansatzfläche für die Halsmuskulatur. Würde man diese Fläche als eben ansehen, so beliefe sich der Inhalt dieses Dreiecks der Hinterhauptschuppe auf 5,8 qcm bei den Wildfüchsen und auf 4,9 qcm

²⁾ $M_W = 2,51 \pm 0,03 \text{ cm}$ $M_F = 2,22 \pm 0,03 \text{ cm}$

³⁾ $M_W = 2,4 \pm 0,02 \text{ cm}$ $M_F = 2,25 \pm 0,01 \text{ cm}$

bei den Farmtieren. Obschon dieses Dreieck nicht die gesamte Ansatzfläche darstellt, so ist es doch in seinem verschiedenen Verhalten als ein Ausdruck für die vermehrte oder verminderte Funktion der Halsmuskulatur zu werten. Bei den Farmfüchsen brauchte die Muskulatur keine kräftigere d. h. breitere und höhere Ansatzstelle sich zu bilden. Zugleich ist die linea nuchalis nicht so kammartig wie bei den Wildfüchsen ausgebildet.

Die schwächere Linea nuchalis, das geringere Ausladen in der Temporalecke und das tieferliegende Opisthokranium lassen auch den abgerundeteren Charakter der Hirnschädelkapfel bei den Farmschädeln stärker hervortreten. In den Abb. (Ansicht von oben) sind bei den Farmschädeln die Temporalecken infolge ihres geringeren Ausladens nicht zu sehen.

Die Lage des Basion kann in jeder Richtung als ziemlich übereinstimmend in beiden Gruppen angesehen werden.⁴⁾ Auch von den beiden anderen Schädelbasispunkten^{5, 6)}, die gemessen wurden, ergab der Mittelwert einen auffallend gleichen Betrag. So liegt unter dem Porion die Basis W: 0,38 cm bzw. F: 0,37 cm tief.⁵⁾

Damit ist ausdrücklich festgestellt, daß die Schädelbasis bei den Farmfüchsen keine Andersorientierung erfahren hat, wie sie etwa Wolfgram bei seinen Gefangenschaftswölfen feststellen konnte. Wohl mag rein äußerlich bei den Farmschädeln das tiefere Abfallen von der Ohrschädelhöhe zum Opisthokranium eine Senkung der Hirnkapfel vortäuschen.

Zugleich zeigt der gleiche Wert des unter dem Porion gelegenen Basispunktes an, daß das Porion selbst im Zuge der Gesamthirnschädelhöhe über diesem Punkt bei beiden Gruppen an derselben Stelle gelagert ist.

Das Porion ergibt tangential mit W: 2,05 cm zu F: 1,98 cm ebenfalls annähernd denselben Durchschnittswert.

$$4) M_W = 0,67 \pm 0,03 \text{ cm} \quad M_F = 0,67 \pm 0,02 \text{ cm}$$

$$5) M_W = 0,38 \pm 0,02 \text{ cm} \quad M_F = 0,37 \pm 0,024 \text{ cm}$$

$$6) B_1 M_W = 0,27 \pm 0,025 \text{ cm} \quad M_F = 0,26 \pm 0,026 \text{ cm}$$

Das Euryon, der Punkt der größten Breite der Hirnkapfel, liegt bei den Wildschädeln ebenso hoch. In der Transversalen erreichen die Farmfüchse hier den Wert der Wildfüchse fast ganz.⁷⁾ Die Wildschädel zeigen in dieser Breite nicht ganz dasselbe Maß wie ihre vorher erwähnte Breite an der Temporalecke; bei den Farmschädeln dagegen verhält es sich umgekehrt, indem die Euryonbreite größer als die Breite an den Temporalecken ist. Auch nach dieser Richtung erscheint daher der Farmschädel abgerundeter. Charakteristisch ist, daß die Wildschädel vom Euryon (es war der am weitesten transversal ausladende Punkt in der Sutura des os temporale als Euryon gewählt) nach dem Jochbogenansatz hin parallel oder sogar weiter ausladend abfallen. Die Hirnkapfel der Farmschädel dagegen verringert meist gleich vom Euryon nach dem Jochbogenansatz hin ihre Breite (auch hier wieder der gewölbtere Charakter der Farmhirnschädel). In den Abbildungen, Ansicht der Schädel von oben, kann man dieses verschiedene Verhalten erkennen.

Hat der Durchschnitt der Farmschädel also den der Wildschädel in der Euryonbreite erreicht, so weisen am Coroneale schon die Farmschädel mit 1,85 cm (gegen W 1,81 cm)⁸⁾ ein leichtes Überschreiten des Wilddurchschnitts auf. Verfolgt man die Kranznaht weiter aufwärts, so zeigt sich, daß an dem oral vorspringendsten (meist sehr deutlich ausgeprägten) Punkte dieser Naht bei den Wildfüchsen der Schädel nur 1,7 cm gegen F 1,8 cm breit ist. Durch diese geringeren Breitenmaße erhält der Wildschädel einen mehr nach vorn zugespitzteren Charakter, welcher aber weiter oral noch deutlicher wird, indem die Wildschädel in eine schmälere Enge hinter den Postorbitalfortsätzen (Schläfengrubenteil des Stirnbeins) auslaufen. Diese Einschnürung ergab bei den Wildschädeln im Mittel 1,11 cm gegenüber dem Farmschädeldurchschnitt 1,2 cm.⁹⁾ Dieser Punkt der Einschnürung liegt bei den Wildschädeln sagittal nicht so stark den Postorbitalia genähert wie dies bei den Farmfüchsen der Fall ist (sehr schön geht dies aus der Abbildung zwischen W 1 und F 1 hervor).

⁷⁾ $M_W = 2,37 \pm 0,02 \text{ cm}$ $M_F = 2,34 \pm 0,009 \text{ cm}$

⁸⁾ $M_W = 1,81 \pm 0,01 \text{ cm}$ $M_F = 1,85 \pm 0,01 \text{ cm}$

⁹⁾ $M_W = 1,11 \pm 0,01 \text{ cm}$ $M_F = 1,2 \pm 0,01 \text{ cm}$

In dieser Region der Einschnürung liegt eine gewisse Ausgleichsmöglichkeit bei der Verkleinerung des Schädels vor. Betrachtet man einmal Schädel W₁, so erfieht man, daß zwischen Einschnürungspunkt und Postorbitale ein Abstand von 0,8 cm vorliegt. Bei Schädel W₂₀, dem kleinsten Wildschädel, beträgt dieser Abstand nur 0,2 cm. Rein äußerlich gesehen, ist also bei dem kleineren Tier der Hirnschädel gewissermaßen unter das Postorbitale getaucht. Alle Farmschädel zeigen hier einen verhältnismäßig kleinen Abstand (im Mittel 0,28 cm, die Wildschädel 0,49 cm).¹⁰⁾

Diese Einschnürung wird auch mit benutzt zur Feststellung von Altersunterschieden, indem mit zunehmendem Alter dieses Breitenmaß kleiner wird. Ein Vergleich des jugendlichen Wildschädels W₁₀ (1,25 cm) mit dem alten W₁₈ (1,0 cm) bestätigt dies. Bedingt ist dieses kleinere Maß bei den älteren Tieren natürlich durch den Gebrauch der Muskulatur. Demzufolge ist es auch nicht bei unseren Farmtieren als Alterszeichen zu verwenden. So zeigt F₁₇ das Maß 1,05 cm, obgleich das Tier nicht älter war als das kleinere F₁₈ mit 1,25 cm. Die älteren Schädel zeigen ebenfalls ein größeres Maß. Aber als Bestätigung der Entstehung dieses geringeren Maßes bei F₁₇ durch eine größere Muskelwirkung, zeigt dieser Schädel die stärkste und die ausgeprägteste Linea temporalis unter den Farmschädeln. Diese verläuft schon gleich als Crista frontalis in stark nach innen geschwungenem Bogen rückwärts und weist beim Überschreiten der Kranznaht den engsten Abstand der beiden Temporalislinien von einander auf. Nicht wunderlich ist es daher, daß dieser Schädel mit der best ausgeprägten Linea temporalis in der erwähnten Einschnürung das Minimum der Farmschädel besitzt.

Die erwähnten Postorbitalfortsätze des Stirnbeins liegen bei den Wildschädeln also weiter nach vorn (W: 4,08 cm, F: 3,69 cm). In ihrer Höhe über diesen Fortsätzen erweisen sich die Farmschädel (entgegen dem früheren Verhalten in der Ohrschädelhöhe) schon etwas niedriger. Damit fällt der Farmhirnschädel auf der kürzeren Strecke (Ohrschädelhöhenpunkt — Postorbitalhöhenpunkt) viel stärker und deutlicher ab. In der Breite der Postorbitalia erreichen beide

¹⁰⁾ $M_W = 0,49 \pm 0,03 \text{ cm}$ $M_F = 0,28 \pm 0,018 \text{ cm}$

Gruppen daselbe Maß.¹¹⁾ Dabei ist aber zu beachten, daß gerade diese Breite am Hirnschädel innerhalb der einzelnen Gruppen außerordentlich schwankt, bei den Wildschädeln um 0,55 cm, bei den Farmschädeln um 0,3 cm. Das große Schwanken der Postorbitalbreite ist bedingt durch das Bestreben, die durch die verschieden große seitliche Ausladung der Jochbogen entstehende größere Hinteraugenlücke (Postorbital- und Jochbogenabstand) auszugleichen.

b) Am Gesichtschädel.

Bei den Messungen der Schädel bildet das Nasospinale den auf der Horizontalebene am weitesten oral reichenden Punkt. In der verschiedenen Größe der Grundlinie Biporion-Nasospinale ist ein Maß für die jeweilige Schädellänge ausgedrückt, zumal die restlichen Gesamtschädellängenanteile (Nasospinale-Prosthion und Porion-Opisthokranion) keine wesentlichen Unterschiede bedingen. Der Abstand dieses Nasospinale von der Frontalebene ist bei den Wildfüchsen zwischen 10,6 cm und 12,7 cm entfernt. Im Mittel beträgt er 11,64 cm.¹²⁾ (Das Mittel der männlichen Schädel beträgt 11,9¹³⁾ cm, das der weiblichen 11,45¹⁴⁾ cm.) Demgegenüber weisen die Farmschädel den Mittelwert 10,92¹²⁾ cm auf bei einem Maximum von 11,6 cm und einem Minimum von 10,3 cm (männlicher Mittelwert 11,05¹³⁾ cm, weiblicher 10,63¹⁴⁾ cm). Von den Farmtieren erreicht nur Schädel F 1 das Mittel der Wildtiere, während von den Wildfüchsen 18 das Mittel der Farmtiere überschreiten. Somit handelt es sich bei dem Farmschädelmaterial um Schädel geringerer Größe.

Diese Verkleinerung braucht natürlich nicht ohne weiteres als durch die Domestikation entstanden gedacht zu werden. Wenn man bedenkt, daß der kleinste Wildschädel und der kleinste Farmschädel sich nur um 0,3 cm unterscheiden, so könnte es sich bei den vorliegenden Durchschnittsmaßen genau so gut um eine zufällige Auslese des Materials handeln, da es sicher noch kleinere Wild-

¹¹⁾ $M_W = 1,7 \pm 0,04$ cm $M_F = 1,74 \pm 0,021$ cm

¹²⁾ $M_W = 11,6 \pm 0,12$ cm $M_F = 10,96 \pm 0,08$ cm

¹³⁾ $M_W \sigma 11,9 \pm 0,2$ cm $M_F \sigma 11,06 \pm 0,09$ cm

¹⁴⁾ $M_W \text{♀} 11,41 \pm 0,12$ cm $M_F \text{♀} 10,71 \pm 0,09$ cm

Füchse gibt, wie es andererseits noch größere Farmschädel gibt als F 1. Daß die geringere Länge der Farmschädel etwa dadurch bedingt sein mag, weil es sich vielleicht im ganzen um jüngere Tiere handeln könnte, kann man mit dem einen Hinweis schon widerlegen, daß der bestimmt jugendliche Wildschädel W 10 keine geringere Größe der Grundlinie aufweist als der wahrscheinlich älteste Wildschädel W 18.

Trotzdem bei diesem jugendlichen Tier der Gesichtschädel nach seiner Knochen- und Nahtbeschaffenheit und nach seinen durch den Zahnwechsel bedingten Knochenaufreibungen im Wachstum noch zurück ist, zeigt das Wildmaterial noch weitere 5 bestimmt ältere Schädel, die nicht über seine Größe hinausgehen.

Vielleicht liegt in der schon erwähnten Feststellung, daß der Fuchs im gebirgigen Gelände besser gedeiht als in flachen Gegenden eine viel berechtigtere und bessere Handhabe, den Größenunterschied zu erklären. Hier würden vielleicht Reihenuntersuchungen an Wildschädeln aus Gegenden mit verschiedenem landschaftlichem Charakter interessante Ergebnisse für das Größenverhältnis ergeben. Daß der kleinste Wildschädel aus Mecklenburg stammt, scheint für diese Annahme zu sprechen.

Da unsere Farmtiere — Fuchsfarmen werden ja am besten in rauhen und gebirgigen Gegenden angelegt — aus einer Höhenlage stammen, müßte dies eigentlich einen größeren Durchschnitt erwarten lassen. Es ist vielleicht nicht so sehr das rauhe Klima, sondern eher das gebirgige Gelände mit den viel größeren Anforderungen an den Bewegungsapparat, das sich auf die Größe auswirkt. Deshalb dürfte allgemein das Zurückbleiben der im Zoo geborenen Füchse in dem für das Tier ungünstigen Lebensterrain zu suchen und zugleich auf die Bewegungseinschränkung zurückzuführen sein.

Damit würde man für die Tiere einen wesentlichen Domestikationsfaktor in der Bewegungseinschränkung nach Nehring annehmen dürfen. Auch der Pfahlbaufuchs, für den Wolgram eine Domestikation im Sinne des Haushundes annahm, zeigt wohl deshalb eine geringere Größe. Haustierrassen, bei denen große Anforderungen an den Bewegungsapparat gestellt werden, wer-

den sich nicht soweit von ihren Ursprungsformen entfernen wie andere stallgehaltene Tiere.

Auch die Zusammenfassung des Materials, — unter den Farmhädeln sind 14, unter den Wildhädeln nur 9 Schädel männlicher Tiere — müßte eigentlich auf Seite der Farmtiere das Plus in der Größe erwarten lassen, zumindest aber keine dem weiblichen Wilddurchschnitt noch so unterlegene Zahl zeigen; und wenn man noch bedenkt, daß der im Zoo geborene Fuchs ein ganz beträchtlich geringeres Maß aufweist (9,9 cm), so spricht das alles zugunsten einer Domestikationsverkürzung der Schädel.

Wir haben aber noch ein letztes ziemlich zuverlässiges Zeichen, das berechtigt, eine Verkleinerung der Farmtiere durch die Domestikation annehmen zu dürfen: das ist die Größe der Zähne. Die Zähne der Farmtiere weisen nämlich Zahnmaße auf, die größer sind als bei den wilden Vergleichstieren. Auch bei den kleinsten Farmtieren stehen die Zahnmaße den großen Wildhädeln nicht nach. Wir wissen, daß die Zähne rein größenmäßig sich ziemlich konstant verhalten, und nicht so sehr den Domestikationswirkungen ausgesetzt sind wie die übrigen Schädelanteile.

Das Os nasale, das wegen des bald zu besprechenden Einbogs von besonderer Wichtigkeit ist, erstreckt sich in seiner sagittalen Ausdehnung im Durchschnitt über eine Gesamtlänge von 4,89 cm bei den Wildtieren, bei den Farmfüchsen von durchschnittlich 4,56 cm. Das Maximum der Wildhädel weist der größte weibliche Schädel W 11 mit 5,8 cm auf, das Minimum der kleinste mit 3,6 cm, während der jüngste Schädel W 10 mit 4,65 cm an 9. Stelle steht (obchon dieser Schädel rein größenmäßig (Nasospinale-Portion) an 15. Stelle steht). Von den Farmhädeln hat F 3 das Maximum mit 5,1 cm Schädel F 13 das Minimum 4,15 cm. (Beim Zoofhädel erstreckt es sich nur über 3,9 cm).

Die Wildhädel schwanken also in der Ausdehnung ihres Nasenbeins um 2,2 cm. Das ist mehr als der gesamte Basislängenunterschied (2,1 cm) zwischen dem größten (W 1) und dem kleinsten (W 20) Schädel, obchon das os nasale in seinem sagittalen Ausmaß kleiner als die Hälfte der Basis ist. Das os nas. schwankt mehr als im Rahmen seines Schädelllängenanteils zu erwarten war. Das macht

sich auch in der verschiedenen Lage des Nasion zur sutura maxillo-frontalis geltend. Zwar schreibt Blasius vom Fuchs, das Nasenbein dringe nicht ganz soweit, wie die hinten nach innen winklig zugespitzten Oberkieferbeine zwischen die Stirnbeine hinein vor. Unter den 20 Wildschädeln sind aber mehrere, bei denen das Nasenbein das Oberkieferbein in seinem aboralsten Punkt längenmäßig erreicht und auch überschreitet; so geht es bei W 11 und W 17 um 0,3 cm über das Oberkieferbein hinaus. Das hier Gefagte gilt auch für die Farmfuchse, nur daß das Überschreiten der Oberkiefer-Stirngrenze geringer ist und in 3 Fällen nur je 0,1 cm beträgt. Bei dem Wildmaterial liegt das Nasale um diese Grenze sehr variabel, nämlich von 0,5 cm oral bis 0,3 cm aboral.

Es ist nun auch nicht so, daß man sagen könnte, daß die kräftig entwickelten größeren Schädel die längeren und am weitesten dorsal sich erstreckenden Nasenbeine aufweisen (so hat W 2 ein Übertreten der Grenze um 0,1 cm, der Schädel W 3 schon ein Zurückbleiben um 0,2 cm aufzuweisen, während der drittkleinste Schädel den W 2 in seiner aboralen Lage der Nasenwurzel noch übertrifft).

Mit der variablen Lage des Nasion in seiner sagittalen Beziehung muß es in vertikaler Hinsicht verschiedene Werte bedingen.

Am Nasale sind neben dem Nasion zunächst noch zwei weitere Punkte gemessen worden, die Nasenspitze und der Bugpunkt. Sagittal verhält sich der Spitzenpunkt im Durchschnitt: (W) 10,59 cm: (F) 9,91 cm; das ist mit 0,68 cm Differenz im Einklang mit dem Unterschied der Grundlinie (0,72 cm). In vertikaler Richtung erhebt sich die Spitze bei den Freitieren um (W) 1,29 cm gegenüber (F) 1,23 cm bei den Wildtieren kaum etwas höher.

Der Bugpunkt ist für uns von besonderer Wichtigkeit. Wir wissen, daß für viele domestizierten Tiere gerade im Einbug der Nase ein wichtiges Merkmal der Domestikationsercheinungen sich darlegt. Die Verkürzung des Fazialteils bringt nämlich gerne eine Aufbiegung der Schnauze mit sich. Wir kennen ja diese besonders prägnant sich zeigende Erscheinung bei den kurzschnauzigen Kulturaffen der Schweine, beim Haushund, beim Niatarind usw. Eine Aufbiegung der Schnauze konnte ja auch W o l f g r a m bei seinen

Wölfen feststellen. Je stärker diese Aufbiegung ist, um so mehr wird sich das an der Eindellung, am Bugpunkt, geltend machen.

Für das vorliegende Material ist zunächst zu bemerken, daß auch bei den wilden Tieren das Profil eine leichte Einbiegung aufweist, vornehmlich bei den kleineren Tieren, während die größeren mehr ebenmäßig abfallen. Vgl. Abbildung (Seitenansicht). Dagegen ist bei den Farmtieren diese Biegung deutlicher und tiefer, wodurch im Durchschnitt der Einbug stärker hervortritt. Dieser Einbug nimmt allerdings kein besonders großes Ausmaß an (Durchschnitt ca. 0,15 cm). Doch wird sein Eindruck durch die Verschiedenheit des Profils, indem die Farmschädel von der Ohrschädelhöhe nach diesem Punkt hin viel stärker abfallen, markanter und mehr betont.

Der höchste Punkt des Oberkieferbeins ist der schon erwähnte aboralste Punkt in der Sutura maxillofrontalis. Das Nasion war um diese Sutur recht verschieden gelagert. Könnte es aber schließlich nicht umgekehrt sein, indem dieser distale Punkt des Oberkieferbeins sagittal sehr variabel liegt? Schon an Hand der Zahlen für die einzelnen Schädel läßt sich ein ruhigeres Fallen oder Steigen der Punkte nach der Größe von der Porionebene aus feststellen. Auch wenn man diesen Punkt vom Nasospinale aus betrachtet und mit dem Nasion vergleicht, so erweist sich seine Lage viel gleichmäßiger als die des Nasions. Der distale Oberkieferbeinpunkt zeigt dann bei der Wildgruppe nur ein Schwanken von 0,7 cm, während das Nasion um 1,9 cm verschieden gelegen ist. Zudem liegt der Oberkieferpunkt viel gleichmäßiger zu den darunter befindlichen benachbarten gemessenen Punkten. Natürlich wird auch das Oberkieferbein nicht streng und starr in derselben Entfernung von der Frontalebene liegen, sondern eine gewisse individuelle Variationsbreite wird auch bei gleichgroßen Schädeln immer vorhanden sein. (So zeigen z. B. bei fast gleicher Grundlinie Schädel W 14 und W 15 in der sagittalen Lage dieses Punktes eine Differenz von 0,4 cm.) Die sagittale Lage dieses Punktes unterscheidet sich für beide Gruppen um 0,42 cm. In vertikaler Beziehung liegt er bei den Wildfüchsen

etwas höher.¹⁵⁾ Demnach fallen die Farmfüchse auch hier auf kürzerer Strecke tiefer ab.

Je mehr ein Schädelpunkt von unferer Porionebene entfernt liegt, um so mehr wird er infolge der verschiedenen Größe der Schädel und der individuellen Variationsbreite verschieden liegen können. Differierte der vorher besprochene Punkt um W 0,9 cm bzw. F 0,5 cm, so schwankt der Vorderaugenpunkt bei der Wildgruppe schon um 1,25 cm (F um 0,6 cm). Im Durchschnitt liegt der Vorderaugenpunkt bei ihr um 0,57 cm weiter oral als bei den Farmschädeln, während er transversal und vertikal kaum eine Verschiedenheit zeigt.

Ähnlich verhält es sich auch mit dem tiefsten Punkt des Augenrandes, dem Orale. Transversal zeigen die Maße bei den Wildfüchsen die ausladendere Tendenz der Jochbogen. Zieht man auf der Verbindung Porion-Orale die Senkrechte im Orale, so geht diese auch in der Farmgruppe an fast derselben Stelle durch den Reißzahn, zeigt also kein Abweichen von der Norm der Wildschädel.

Das Tuber liegt sagittal von der oberen Ausdehnung der Maxilla (von der Oberkieferstirnbeinnaht) 1,15 cm bei den Wildfüchsen, bei den Farmfüchsen 1,29 cm weiter aboral.

Der vorderste Punkt des Oberkieferbeins JM ist in seiner sagittalen Lage im Mittel um 0,72 cm für beide Gruppen verschieden gelegen (also schon wie der Längenunterschied der Grundlinie selbst). In der Entfernung von der Medianebene lag bei den Werten kein Unterschied vor. Auch kommen die Breitenmaße an der am weitesten ausladenden Stelle des Os maxillare am Alveolarrand zwischen dem Reißzahn und dem 1. Molar sich im Durchschnitt gleich¹⁶⁾, d. h. also, daß in allen diesen Maßen die kleineren Farmschädel relativ breiter sind. Wichtig ist, daß dieser Punkt bei den Farmschädeln keineswegs tiefer oder höher liegt¹⁷⁾, da man einerseits mit einer Aufbiegung der Schnauze eine Lageverschiebung

¹⁵⁾ $M_W = 2,73 \pm 0,038$ cm $M_F = 2,64 \pm 0,026$ cm

¹⁶⁾ $M_W = 2,04 \pm 0,02$ cm $M_F = 2,02 \pm 0,015$ cm

¹⁷⁾ $M_W = 0,89 \pm 0,03$ cm $M_F = 0,92 \pm 0,023$ cm

dieses Punktes erwarten könnte, andererseits bei einer geringeren Entfaltung und einem schwächeren Ausbau des Gebisses einen nicht so tief gelegenen Punkt erwarten dürfte, da dieser Punkt beim Wachsen abwärts steigt; so hat z. B. der junge W 10 das vertikale Minimum für diesen Punkt 0,4 cm gegenüber dem Durchschnitt 0,85 cm. Zwischen Orale und diesem tiefsten Punkt beträgt die vertikale Entfernung im Mittel W: 1,74 cm gegenüber F: 1,62 cm, beim jugendlichen W 10 erst 1,5 cm.

Das Oberkieferbein in seiner Ausdehnung vom vordersten Punkt am Außenrand des Incisivum (JM.) bis zu seiner distalen am Stirnbein gemessen, ergibt die Vergleichswerte W: 5,1 cm zu F: 4,8 cm. Würde man aber keine über die maximale Größe der Farmtiere hinausgehenden Wildschädel berücksichtigen, so stellen sich die Durchschnittswerte dieses Maßes auf W: 4,89 und F: 4,83 cm.¹⁸⁾ Damit stellen wir fest, daß die Farmschädel in diesem wichtigen Gesichtsabschnitt gegenüber den Wildschädeln (soweit diese sie nicht an Länge übertreffen) keine über das Wildmaß hinausgehende Veränderung erkennen lassen. Daraus geht auch hervor, warum es nicht zu einem größeren Einbug bei den Farmtieren kommen konnte.

Wirft man noch kurz einen Blick auf das Oberkieferbein in seiner unteren Ausdehnung von JM. bis zum Tuber, so muß man auch hier trotz des großen Abschnitts ein nahes Zusammentreffen der Werte für W und F (6,25 cm und 6,11 cm)¹⁹⁾ feststellen. Würde man auch hier nur die vorhin verglichenen Wildschädel, die nicht größer sind als die Farmschädel (unter Ausschaltung von W 10 wegen seiner noch nicht abgeschlossenen Entwicklung und W 9, bei dem die oberen M² fehlen), so stellen sich die Werte W: 6,1 zu F: 6,11 cm.²⁰⁾

Nun soll noch der Gesichtsabschnitt von diesem vordersten Punkte des Oberkieferbeins bei JM. bis zum Prosthion verglichen werden. Dieser Abschnitt bietet aber mit seinen Durchschnittswerten (W) 1,08 cm und (F) 1,14 cm keine Besonderheit.

¹⁸⁾ $M_W = 4,91 \pm 0,05 \text{ cm}$ $M_F = 4,81 \pm 0,04 \text{ cm}$

¹⁹⁾ $M_W = 6,25 \pm 0,06 \text{ cm}$ $M_F = 6,1 \pm 0,05 \text{ cm}$

²⁰⁾ $M_W = 6,11 \pm 0,04 \text{ cm}$ $M_F = 6,1 \pm 0,05 \text{ cm}$

Wolffgram legte bei den Wölfen der ziehenden, zerrenden und haltenden Kraft beim Jagen und Ergreifen der Beute ein großes Gewicht bei, indem dieses auf den Schnauzenteil einen wachstumsfördernden Impuls auslöse. Wir sehen aber für unsere Käfigtiere, denen diese Gelegenheit zum Zerren und Fangen genommen ist, in der Schnauze keinen wesentlichen Unterschied, da ein ziemlich gleicher Befund für den ganzen unteren Gesichtsabschnitt festzustellen war.

Vom Gesichtschädel in seiner sagittalen Ausdehnung kann man sich ein anschauliches Bild machen, wenn man die Grundlinie unter Einbeziehung des Prosthions in den Abschnitt Prosthion-Tuber und in den hinteren Abschnitt Biporion bis Tuber einteilt. Dabei ergibt der Durchschnitt in der W-Gruppe im Schnauzenteil 7,35 cm gegenüber dem Hirnabschnitt 4,51 cm, oder wenn wir aus den schon erwähnten Gründen W₉ und W₁₀ ausschließen wollen 7,39 cm : 4,54 cm. Bei den Farmschädeln liegt das Verhältnis 7,25 cm : 3,95 cm vor. Daraus läßt sich ersehen, daß an der Verkleinerung der Größe der Farmschädel der Schnauzenabschnitt nur mit 0,14 cm beteiligt ist, der Hirnabschnitt dagegen mit 0,59 cm. Das deutet darauf hin, daß im Schnauzenabschnitt infolge der Resistenz des Kauorgans gegenüber den verkleinernden Einflüssen der Domestikation ein langsames Tempo der Abnahme vorliegt, als für den Hirnschädel.

War am Hirnschädel die Postorbitalbreite, die am meisten variable, so ist es im Gesichtschädel die Breite am Zygion. Die Jochbogen zeigen in ihrer Breite bei den Wildschädeln um 1 cm verschiedene Maße. Das Mittel für dieses Maß beträgt 3,76 cm.²¹⁾ Bei den Farmtieren ist der Unterschied nur 0,45 cm bei einem Mittelwert von 3,61 cm. Sagittal und vertikal liegt das Zygion auch hier in beiden Gruppen fast gleich. Bei dem jugendlichen Tier W₁₀ beträgt die Jochbogenbreite erst 3,45 cm, während erwachsene Schädel mit derselben Grundlinie schon 3,65 cm und 3,7 cm aufweisen. Wäre W₁₀ älter geworden, so hätte bei der weiteren Entfaltung und Aktion des Musc. temporalis, der dabei entstehende laterale Druck

²¹⁾ $M_W = 3,76 \pm 0,06 \text{ cm}$ $M_F = 3,62 \pm 0,02 \text{ cm}$

allmählich den Jochbogen zum Knochenabbau an seiner Innenfläche und zum Knochenanbau an seiner Außenfläche gebracht.

Schädel W 5 zeigt ein zu seiner Gesamtlänge auffallend kleines Zygionmaß (3,55 cm), bei dem nächst größeren und dem nächst kleineren Schädel beläuft es sich auf 4,1 cm bzw. 4,0 cm. Dieser Schädel W 5 weist in allen Breitenmaßen verhältnismäßig kleine Zahlen auf; so besitzt er mit W 20 das Minimum der kleinsten Stirnbreite (1,15 cm). Der ganze Schädel stellt überhaupt einen besonders schlanken Typ dar, sodaß er im Gesamtschädelindex und auch im Gesichtschädelindex den kleinsten Wert aufweist. Auch dieses Tier W 5 stammt wie W 20 aus Mecklenburg.

An der Stelle, wo die beiden Orbita am weitesten in ihrer Umrandung medial einbuchten, liegt die kleinste Stirnbreite. Auch in dieser Breite haben wir ein größeres Intervall bei den Wildföchsen (von 1,15—1,65 cm); (bei den Farmtieren nur von 1,25 bis 1,5 cm). Die Farmtiere erreichen auch hier wieder das Mittel ihrer Partner.

Diese Stirnbreite ist bei den Wildtieren immer größer als die Einschnürung hinter den Postorbitalia. Bei den Farmföchsen liegen diese beiden Maße oft nahe im Wert beieinander, einmal bei F 3 sind sie gleich. Bei dem Zoofuchs übertrifft die Enge hinter dem Postorbitale die kleinste Stirnbreite 1,2 : 1,1 cm.

Der Unterkiefer der Farmschädel, gemessen vom proc. angularis bis zum Infradentale ist um 0,59 cm kleiner als der Wilddurchschnitt. Im Gonion reicht er nicht ganz auf die Tiefe der Wildgruppe, dagegen sinkt er weiter oral unter der Wurzel seines Reißzahnes auf dieses größte Maß²²⁾, das bei den Wildschädeln mehr dem Gonion zu festzustellen war. Da die Farmschädel bei ihrer geringeren Größe doch im Unterkiefer auf das Maß der Wildschädel herabreichen, und dieser Punkt mehr oral gelegen ist, zeigt der Unterkiefer eine stärker gebogene Form, die besonders bei den kleinen Schädeln stark ausgeprägt ist. (Vgl. Abb.)

²²⁾ $M_W = 2,76 \pm 0,04 \text{ cm}$ $M_F = 2,78 \pm 0,038 \text{ cm}$

c) am Kiefer.

Die größte Schädelbreite am Alveolarfortsatz des Oberkiefers zwischen M^1 und dem Reißzahn liegt von Porion aus um 0,55 cm; vom Prosthion aus gemessen (mit W: 6,0 cm zu F: 5,89 cm) nur um 0,11 cm verschieden. In der Breite selbst ist zwischen beiden Schädelklassen keine wesentliche Differenz.²³⁾ Dementsprechend erweist sich die Kieferbreite an der distalen Wurzel der letzten Molaren²⁴⁾ und die Breite an der mesialen Wurzel des Reißzahnes²⁵⁾ ebenfalls als fast gleich. Danach dürfte auch der Winkel, den Reißzahn und Molaren miteinander bilden, kaum verschieden sein. Nach dieser größten Kieferbreite verjüngt sich der Kiefer oral bis zu der Stelle der kleinsten Kieferbreite zwischen P^2 und P^1 mit (W) 1,0 cm zu (F) 1,04 cm, um dann weiter nach vorn mit (W) 1,17 cm zu (F) 1,16 den größten Abstand im Bereich der Alveolen der Eckzähne zu zeigen.

Bei allem ist aber zu beachten, daß der Alveolarfortsatz bei den Wildfüchsen hauptsächlich im Prämolarengebiet viel abgerundeter in den aufsteigenden Teil des Oberkieferbeins übergeht; dagegen erfolgt der Übergang bei den Farmfüchsen sehr scharfkantig und die Zähne laden mit ihrem größten Aquator etwas über den Alveolarrand aus. Dieses tritt sehr schön in Erscheinung, wenn man die Schädel senkrecht von oben etwa über dem Nasenbug betrachtet. Bei den Wildschädeln sieht man dabei nur die Frontzähne, bei den Farmfüchsen jedoch deutlich auch die Backenzähne; während bei ersteren der Alveolarfortsatz den dabei sichtbaren Rand des Oberkieferbeins bildet, sind hier deutlich die Prämolaren und der erste Molar als Saum zu sehen. Durch den schwächeren Bau des Knochens am Alveolarfortsatz treten bei den Farmfüchsen die Jugalveolen deutlicher hervor. Bei den Wildfüchsen liegt die Alveole besser in die stärker entwickelte Portio gleichsam eingebettet.

²³⁾ $M_W = 2,04 \pm 0,02$ cm $M_F = 2,02 \pm 0,015$ cm

²⁴⁾ $M_W = 1,75 \pm 0,02$ cm $M_F = 1,72 \pm 0,01$ cm

²⁵⁾ $M_W = 1,69 \pm 0,02$ cm $M_F = 1,64 \pm 0,01$ cm

Beim Vergleich des Gaumenbeins beider Gruppen fällt das ungleiche Verhalten des Gaumenendes gegenüber dem Abschluß der Zahnreihe auf. Endet bei den Wildlingen der Gaumen in Staphylion durchschnittlich nicht ganz 0,2 cm vor der distalen M²-M²-linie, so ist bei den Farmfüchsen der Abstand viel größer und beträgt im Durchschnitt 0,54 cm.²⁶⁾ Bei den Wildtieren zeigen einzelne Schädel sogar ein dem Zahnabschluß gleichkommendes Staphylion (z. B. vgl. Abb. größter Wildschädel); bei den Farmfüchsen reicht dieses nie näher als 0,3 cm an die distale M²-M²-linie heran. Vertikal zeigt das Staphylion keinen wesentlich andersgelagerten Tiefpunkt.²⁷⁾ Bemerkenswert ist, daß das Staphylion beim jugendlichen W 10 noch 0,05 cm über der Horizontalebene liegt, während der Durchschnitt 0,34 cm unter dieser Ebene liegt.

Das Os palatinum selbst zeigt in der Wildgruppe eine mittlere Länge von 2,12 cm gegenüber F: 1,84 cm. Auch der jugendliche Wildschädel W 10 hat ein 2,0 cm langes Gaumenbein, das in seinem vorderen Punkt noch 0,15 cm über der Horizontalebene liegt (Mittel W 0,14 cm unter dieser Ebene).

Vom Prosthion aus betrachtet zeigt der Zahnreihenabschluß bei beiden Gruppen nur eine Differenz von 0,19 cm. Die Zahnreihe ist also gegenüber den Wildlingen bei den Farmtieren relativ länger. Das Gaumenbein selbst bleibt jedoch gegenüber dieser Verlängerung zurück. Durch diese Zunahme des alveolären Oberkieferbeins wird auch der Raum zwischen Kiefergelenk und Zahnbogenabschluß eingeengt. Während die meisten Wildfüchse eine größere Breite des Knochens hinter dem Abschluß der M² in einem Flügelfortsatz des Oberkieferbeins aufweisen, schließt bei den Farmfüchsen (auch Zoo-fuchs) hier der Knochen schmalstens und glatt ab, gleichsam als ob der Rachen keine Ausprägung dieses Flügelfortsatzes, wie auch andererseits keine weitere Zurücklagerung des harten Gaumens wegen einer Raumbeengung zugelassen hätte, was nach dem Befund der starken Verkleinerung der Strecke Porion-Tuber bei den Farmfüchsen erklärlich ist.

²⁶⁾ $M_W = 0,18 \pm 0,04 \text{ cm}$ $M_F = 0,53 \pm 0,02 \text{ cm}$

²⁷⁾ $M_W = 0,36 \pm 0,02 \text{ cm}$ $M_F = 0,33 \pm 0,02 \text{ cm}$

Der Unterkiefer zeigt in seinem Verhalten des Infradentale zum Prosthion keine Besonderheiten. In den intermaxillären Beziehungen finden wir in bezug auf die Schneidezähne sowohl einen orthognathen Überbiß als auch Kopfbiß in beiden Gruppen.

Wenn wir den Oberkiefer in die folgenden Abschnitte Prosthion — JM. (lateralster Punkt der Maxilloincisivsutur), JM. — Reißzahn (incl.) und M¹(mes.)—M²(dist.) einteilen, so ergibt der Durchschnitt des ersten Teils W 1,06 cm : F 1,14 cm; der des zweiten W 4,92 cm : F 4,75 cm und der des dritten W 1,35 cm : F 1,36 cm. Der erste und letzte Abschnitt ist also für die Farmtiere absolut größer. Bei dem mittleren (Prämolarenabschnitt) dagegen ist für die Farmfische ein geringerer Wert festzustellen.

Gerade im Prämolarenteil kann sich die Differenz der Gesichtsschädelgröße leicht zeigen. Beim Vergleich des größten W 1 mit dem kleinsten Wildschädel W 20 müssen wir im Prämolarengebiet einen Verlust von 0,95 cm feststellen, während die übrigen Zahnabschnitte sich nahezu gleich verhalten.

Hier im Lückgebiß, wo der Abschnitt große Interdentalräume zeigt, hat der Gesichtsschädel die Möglichkeit, sich zu verkleinern bzw. nicht auszuwachsen (vgl. ähnlich wie am Hirnschädel die Region der Postorbitalenge), ohne daß es zunächst zu einer ernstlichen Verschiebung in der Zahnreihe zu kommen braucht. Und so sieht man, wie bei den kleineren Wildschädeln unter Einbuße der Zwischenräume die Zähne näher aneinander rücken und in einen mehr oder weniger leichten Kontakt geraten.

Diese kleineren Wildschädel zeigen in ihrem Verhalten des Kiefers und der Zähne noch kein Mißverhältnis. Erst wenn die Verkürzung der Kiefer höhere Grade annimmt, mit der die Reduktion der Zähne nicht gleichen Schritt gehalten hat, kommt es zur Verschachtelung und zu einer kulissenartigen Stellung der Zähne. Dieses Mißverhältnis zwischen Kiefer und Zähnen ist aber ein ausgesprochenes Domestikationszeichen, wie schon H. v. Nathusius und Nehring zeigten und wie Walkhoff auch für den Menschen bestätigen konnte.

Wenn man wieder die früher schon gewählten kleineren Wildschädel, die nicht über das Maximum der Farmtiere hinausgehen

(W 9 und W 10 ausgeschaltet) zugrunde legt und den Prämolarenabschnitt vergleicht, so läßt das Verhältnis W 4,77 cm : F 4,75 cm keine über das Wildmaß hinausgehende Verkürzung erkennen.²⁸⁾ Nur die gegenüber dem Wildschädel größeren Zähne verursachen die Schachtelstellung. Ein Vergleich zwischen W 20 und F 19 (vgl. Abb.) zeigt, daß der Eckzahn-Prämolarenabschnitt gleich ist (W 4,4 cm und F 4,4 cm). Die Zähne aber, die in diesem Abschnitt stehen, weisen in der Summe ihrer mesiodistalen Durchmesser beim Farmtier 0,8 cm mehr auf. Zwar steht dem Farmschädel durch seine größere Breite eine gewisse Ausgleichsmöglichkeit zu, die aber eine Verschachtelung der Zähne nicht hintanhaltend konnte.

Bei den Farmschädeln kam es bei vier Tieren zu einer solchen Schachtelstellung. Darüber hinaus zeigen weitere 6 Schädel im Ober- oder Unterkiefer mehr oder weniger starke Abweichungen oder Besonderheiten in der Zahnstellung (gedrängte Stellung, Außenkip-
 pung bes. im Unterkiefer etc.). Bezeichnend ist, daß nur 5 Farmschädel eine lückige Prämolarenstellung aufweisen, wie man sie bei den Wildtieren findet.

Nach der Größe der Zähne ist zu schließen, daß die Zucht der Farmtiere von großen, kräftigen Wildtieren ausgegangen ist, die an Größe den Wildschädel W 1 noch übertroffen haben dürften.

d) an den Zähnen.

Aus dem letzten Abschnitt über die Zahnstellung war schon zu ersehen, daß in der Größe der Zähne bei den Wild- und Farmtieren Unterschiede sich geltend machten. Die Zahnmaße der größeren Farmschädel übertreffen in ihrer Größe die der größeren Wildschädel. Andererseits sind die Zähne der kleinen Farmschädel noch so groß, daß sie den Maßen der größeren Wildschädel nicht nachstehen. Besonders deutlich zeigt sich das auch am oberen und unteren Reißzahn (bei Betrachtung seiner mesiodistalen Achse) in folgender Gegenüberstellung:

²⁸⁾ $M_W = 4,75 \pm 0,06 \text{ cm}$ $M_F = 4,75 \pm 0,05 \text{ cm}$

W₁ : W₂₀ oberer Reißzahn 1,3 : 1,25 cm

W₁ : W₂₀ unterer Reißzahn 1,5 : 1,4 cm

F₁ : F₂₀ oberer Reißzahn 1,45 : 1,3 cm

F₁ : F₂₀ unterer Reißzahn 1,6 : 1,5 cm

Ein auffallend kleiner Zahn ist der untere M₃; er macht den Eindruck eines rudimentären Gebildes. Interessant ist nun, daß dieser Zahn bei mehreren Farmschädeln nicht mehr gebildet ist. Dagegen zeigen die Wildschädel mit einer Ausnahme (Schädel W₉) alle diesen Zahn. Dieser Schädel W₉ besitzt überhaupt die kleinsten Zahnmaße; wohl ist er der kleinste männliche Schädel, aber seine Maße fallen gegenüber dem noch kleineren ♀ W₂₀ stark ab, so zeigt z. B. der obere und der untere Reißzahn folgendes Zahlenverhältnis W₂₀ 1,25 : W₉ 1,1 und 1,4 : 1,15 cm. Es sind also auffallend kleine Reißzähne, die sogar von den kleinen Maßen des Zoofuchses übertroffen werden. Noch interessanter ist es, daß diesem Schädel W₉ außer den fehlenden unteren dritten Molaren — diese könnten, obwohl zuletzt erschienen, früh ausgefallen und die Alveolen zugewachsen sein — im Unterkiefer beiderseits noch die P₄ im Oberkiefer die M² fehlen. Dabei kann es sich nicht um einen zufälligen Verlust dieser Zähne handeln; abgesehen von der Symmetrie des Fehlens verrät die Form des Alveolarabchlusses im Oberkiefer und das freizackige gleichmäßige Auslaufen im sog. Flügelfortsatz des Oberkieferbeins, daß hier niemals ein Zahn gestanden haben kann. Auch im Unterkiefer ist der Alveolarkamm in der Gegend der fehlenden P₄ gleichmäßig und voll aufgebaut, vielleicht läßt eine angedeutete leichte Porosität in der Corticalis einer Seite vermuten, daß hier einmal ein Milchzahn gestanden hat. Wie wir sehen, ist der Zahnbefund dieses Tieres außerordentlich beachtenswert. Wäre dieses Tier in Gefangenschaft aufgewachsen, wäre man nur zuleicht geneigt, diese Verminderung der Zahnzahl mit der Domestikation in Beziehung zu bringen. Man ersieht hieraus, wie vorsichtig man jeden Befund bei den domestizierten Tieren einschätzen muß, wenn solcherlei Erscheinungen in freier Wildbahn vorkommen. Nun sind aber bei den Farmfüchsen trotz der Domestikation die Zähne sehr groß gebildet; nur der M₃ ist als einziger Zahn kleiner als bei den Wildfüchsen. Da der M₃ schon bei den Freifüchsen rudimentär ge-

bildet ist, könnte man sich sehr wohl eine rasche Elimination dieses Zahnes aufgrund der Domestikation denken, zumal ja auch der Fortfall des sog. Flügelfortsatzes hinter dem Zahnreihenabfluß im Oberkiefer und das Zurückbleiben des Gaumens im Staphylion bei den Farmföchen auf den Räumangel hindeuteten.

Auf noch einen weiteren Zahnbefund bei einem Fuchs aus der Freiheit sei hier hingewiesen: Schädel W 11 besitzt oben rechts den P¹ doppelt, wovon der vordere allerdings etwas kleiner ist. Um einen persistierenden Milchzahn kann es sich nicht handeln, da dieser erste Zahn hinter dem Eckzahn keinen Vorgänger im Milchgebiß hat.

Trotz der kleinen Schädelzahl fehlt es nicht an einigen pathologischen Befunden am Zahnsystem, zahlenmäßig mehr bei den Freitieren als bei den Farmtieren. So zeigen die Wildfüche mehrere durch den Kauakt gesprengte Zähne (Knochenzermahlung), ebenso einige bis auf die Wurzeln abgebrochene Zähne. Mehrere abgekaute Eckzähne zeigen offenliegende Pulpenräume. Letzteres finden wir aber auch bei den Farmtieren, wie z. B. in der Abbildung Schädel F 1 zeigt. Bei einem Wildschädel kam es zu einer bedeutenden Einschmelzung über der mesialen Wurzel eines oberen gesprengten Reißzahnes, wobei auch der äußere Knochenrand des Foramen Infraorbitale zum Teil eingeschmolzen wurde. Unter den Farmfüchen ist als wesentlicher Nebenfund eine übererbsengroße, wahrscheinlich vom Milchzahn herrührende Cyste im Unterkiefer zu erwähnen. Die Wurzeln des darüber befindlichen äußerlich intakten Prämolaren sind etwas arrodiert.

3. Zusammenfassung.

Faßt man noch einmal kurz die wichtigsten Ergebnisse zusammen, so ist als erstes die Verkleinerung der Farmschädel als durch die Domestikation bedingt aufzufassen.

Der höhere Schädel, der gewölbtere und abgerundetere Charakter des Hirnschädels, auch die breiteren Maße in der vorderen Schläfengrube sind als Beibehaltung eines jugendlichen Merkmals zu werten.

Bei den Farmtieren ist die Höhe des Opisthokraniums keine so große. Diese niedrigere Höhe wie auch die sich durch die geringer

ausladende Temporalecke ergebende kleinere Breite (gegenüber den Wildschädeln) ist gegeben durch den verminderten Gebrauch der Nackenmuskulatur. Durch den geringeren Gebrauch dieser Muskulatur ist auch die Crista nuchalis nicht so markant ausgebildet.

Durch die geringere Entfaltung der Temporalismuskulatur fehlen den Farmtieren die Schädelaufbauten in Form der Sagittalkämme. Auch die relativ große Breite im Euryon, die absolut größere im Coronale und in der Einschnürung hinter den Postorbitalia sowie auch die relativ breiteren Maße im Gesichtschädel sind ebenfalls durch die Domestikation bedingt. Zu einer Senkung und Verschiebung der Hirnschädelbasis wie sie bei anderen gefangenen Caniden festgestellt wurde, ist es nicht gekommen, wie der übereinstimmende Schädelbasisbefund bezeugt. Der Hirnschädel hat in dem Abschnitt der Einschnürung hinter den Postorbitalfortsätzen eine Größenausgleichsmöglichkeit, die vielleicht auch eine Andersorientierung des Hirnschädels hintanhält.

Im Gesichtschädel ist keine wesentlich stärkere Verkürzung als bei den Freitieren nachzuweisen. Im Profil fallen die Farmschädel stärker und rascher zu einem etwas tieferen Einbug ab.

Bei den Farmtieren kommt der Durchschnitt des Incisiv- und des Molarenabschnitts dem der Wildtiere gleich. Der Prämolarenteil ist dagegen dem des Wildmaterials unterlegen (unterschreitet aber das Maß der gleichgroßen Wildschädel nicht). Hier im Prämolarenabschnitt hat der Gesichtschädel ebenfalls eine Größenausgleichsmöglichkeit, die sich auch schon bei den Wildtieren durch die Einbuße, bzw. durch das Nicht- oder das schwächere Auswachsen der Interdentallücken zeigt.

Es besteht aber ein deutlicher Unterschied bei dem Zahnverhalten dieses Abschnitts zwischen kleinem Wildtier und Farmtier. Die kleineren Zähne der Wildtiere lassen es nicht zu einer Kulissenstellung kommen. Diese ist bei den Farmschädeln in 4 Fällen eingetreten. 6 Schädel zeigen weitere Unregelmäßigkeiten in der Zahnstellung.

Auf Grund des Zahnbefundes läßt sich schließen, daß die Vorfahren der Farmtiere sehr große und kräftige Zuchttiere gewesen sind, und daß für die Farmtiere günstige Bedingungen für die Zahn-

entwicklung vorgelegen haben. Bei den kleineren Wildtieren paßt sich die geringere Zahngröße harmonisch in das Schädelbild ein, während das ungleiche Verhalten der Kiefer und Zähne bei mehreren Farmtieren zu einer Disharmonie geführt hat.

Bei den Farmtieren liegt bei einzelnen Schädeln vermutlich durch die Domestikation Nichtanlage der unteren 3ten Molaren vor; aber auch bei den Wildtieren kommt Verminderung der Zahnzahl wie auch Überzahl der Zähne vor.

Der relativ große Zahnabschnitt bei den Farmtieren läßt keine Entwicklung eines Flügelfortsatzes des Oberkieferbeins am Abschluß der Zahnreihe mehr zu. Der Gaumen macht die Längenzunahme der Zahnreihe nicht mit und schließt im Verhältnis zur Zahnreihe verkürzter im Staphylion ab.

Der Unterkieferkörper ist stärker gebogen, da er in seinem Ausgangs- und Endpunkt (Gelenk und Infradentale) mit den Freitieren gleiche vertikale Maße zeigt und auch trotz seiner kleineren Länge den tiefsten Punkt der Wildtiere im Mittelabschnitt erreicht.

Der Alveolarrand ist bei den Farmtieren scharfkantiger, der Knochen leichter.

Zu einer Verkürzung, wie bei dem Zoofuchs, den F a b i a n in seiner Abhandlung über die Merkmale und Grenzen in der Domestikationsfrage zeigt, oder zu Störungen im Wachstum, wie uns K l a t t von Zoofüchsen berichtet, ist es bei dem vorliegenden Zoofuchs nicht gekommen. Der Zoofuchs unterscheidet sich im wesentlichen von dem Zoofuchs Fabians dadurch, daß er nicht so große Breitenmaße aufweist und seine Zahnmaße kleiner sind. Deshalb kam es auch bei ihm nicht zur Kulissenstellung der Zähne. Der Gedanke liegt nahe, daß dieser Zoofuchs von einem schon von Natur aus angeglichenen „Kümmerer“ abstammt, während der Zoofuchs Fabians auf große, kräftige Exemplare zurückgehen dürfte.

Von den Zoofüchsen ist bekannt, daß sie nur schwer weiterzüchten. Im Gegensatz dazu stehen die Farmfüchse. Dies dürfte nicht zuletzt auf eine gute Haltung und Pflege der Tiere zurückzuführen sein. Gilt es ja bei diesen Tieren einen vollwertigen Pelz zu gewinnen. Nichts aber ist gegen eine ungünstige Haltung empfind-

licher als das Integument (insbesondere das Haarkleid). Dazu kommt das gebirgige und rauhe Klima, das für die Fuchsfarmen eine wichtige Rolle spielt. Die freie Licht- und Sonnenbestrahlung wird auf den Gefundheitszustand der Farmtiere günstig wirken und den Mangel der Bewegungseinschränkung sowie andere Nachteile, vielleicht auch Ernährungsfehler wettmachen.

Die im Verhältnis zum Ausgangsmaterial geringere Größe der Tiere aber zeigt, daß in der Haltung und Zucht vielleicht einzelne Momente noch unterfucht und das eine oder andere noch verbessert werden könnte, um, wie bei vielen domestizierten Tieren, die Ursprungsgröße wieder zu erreichen oder sie sogar noch zu übertreffen.

Es ist mir eine angenehme Pflicht, Herrn Prof. Dr. K o r k - h a u s für die Überlassung des Themas und die Anregungen bei der Arbeit meinen verbindlichsten Dank auszusprechen.

*) v = vertikale, s = sagittale, t = transversale Masse.
 **) Negative Zahlen bedeuten unterhalb der Mittellinie.
 ***) I. 74

bedeuten unter der Horizontalebene oder hinter der Frontalebene gelegene Punkte.

II. Maßpunkte am Gesichtsschädel.

Durchschnittswerte.

Schädel	Ns	Pr	Sp	Nb	N	Smt	Or	Va	Zy
a) Wildfüchse.									
♂♂	v	-0.24	1.31	1.88	2.71	2.74	0.88	1.22	0.89
	s	12.11	10.85	8.01	5.83	5.78	5.99	6.42	2.35
	t						2.86	2.20	2.87
♀♀	v	-0.25	1.28	1.83	2.64	2.69	0.8	1.14	0.85
	s	11.68	10.4	7.78	5.61	5.57	5.77	6.15	2.24
	t						2.70	2.14	3.69
♂♂+♀♀ +0	v	-0.24	1.29	1.87	2.68	2.73	0.85	1.19	0.87
	s	11.86	10.59	7.87	5.7	5.66	5.85	6.21	2.27
	t						2.77	2.16	3.76
b) Farmfüchse.									
♂♂	v	-0.27	1.23	1.75	2.55	2.67	0.71	1.15	0.86
	s	11.32	10.06	7.43	5.40	5.24	5.38	5.82	2.3
	t						2.65	2.04	3.65
♀♀	v	-0.23	1.21	1.68	2.48	2.55	0.68	1.15	0.91
	s	10.93	9.71	7.25	5.22	5.2	5.16	5.7	2.05
	t						2.63	1.96	3.51
♂♂+♀♀	v	-0.26	1.23	1.73	2.53	2.64	0.7	1.15	0.88
	s	11.2	9.91	7.38	5.35	5.24	5.32	5.78	2.22
	t						2.64	2.02	3.61

III. Maßpunkte an Kiefer und Zähnen.

Durchschnittswerte.

Schädel	JM	W	Rsp	Gbr	Ta	Gm	St	Id	Fml	Go	Uk	PrA
a) Wildföchse.												
♂♂	v	-0.01	-1.52	-0.89	-0.63	-0.16	-0.38	-1.31	-1.91	-2.68	-2.81	-1.37
	s	11.01	6.7	6.01	4.73	6.95	4.82	11.76	9.63	4.73	6.44	1.19
	t	0.91	1.59	2.08	1.83				0.67	1.26	0.76	2.46
♀♀	v	-0.01	-1.53	-0.95	-0.67	-0.16	-0.35	-1.3	-1.83	-2.62	-2.76	-1.31
	s	10.61	6.37	5.77	4.4	6.74	4.62	11.26	9.39	4.4	5.98	1.22
	t	0.88	1.54	1.99	1.71				0.62	1.26	0.92	2.46
♂♂ + ♀♀ +	v	-0.01	-1.53	-0.89	-0.62	-0.14	-0.34	-1.3	-1.85	-2.62	-2.76	-1.31
	s	10.78	7.03	5.86	4.53	6.82	4.7	11.47	9.48	4.53	6.16	1.21
	t	0.89	1.57	2.02	1.76				0.65	1.26	0.84	2.45
b) Farmföchse.												
♂♂	v	+0.02	-1.55	-0.95	-0.61	-0.18	-0.32	-1.43	-1.93	-2.57	-2.85	-1.42
	s	10.16	6.66	5.35	3.96	6.39	4.52	10.88	9.03	3.96	6.03	1.1
	t	0.77	1.66	2.03	1.85				0.63	1.35	0.9	2.6
♀♀	v	+0.04	-1.46	-0.88	-0.53	-0.2	-0.35	-1.3	-1.8	-2.4	-2.61	-1.36
	s	9.83	6.47	5.22	3.9	6.19	4.41	10.58	8.78	3.9	5.93	1.15
	t	0.87	1.6	1.97	1.69				0.58	1.32	0.84	2.4
♂♂ + ♀♀	v	+0.03	-1.52	-0.92	-0.59	-0.19	-0.33	-1.37	-1.89	-2.52	-2.78	1.41
	s	10.06	6.61	5.31	3.95	6.33	4.49	10.79	8.95	3.95	6.02	1.11
	t	0.8	1.58	2.02	1.8				0.62	1.34	0.88	2.54

Abbildungen.

Seitenansicht: Die Farmschädel zeigen deutlich das tieferliegende Opisthokranion. Das stärkere Abfallen des Profils zum etwas tieferen Nasenbug ist besonders beim kleinen Farmschädel, der deutlich die Tendenz einer Aufbiegung der vorderen Schnauzenpartie andeutet, zu sehen; der Unterkiefer hat besonders bei diesem Schädel stark gebogene Form.


Ansicht von oben: Hier ist das breitere Coronale und die stärkere Einschnürung der Farmschädel zu sehen; letztere ist dem Proc. postorbitalis sagittal stark genähert, bes. beim Vergleich des großen Farm- mit dem großen Wildschädel.

Beim Farmtier fällt der Hirnschädel unterhalb des Euryon unter sich gehend ab, sodaß man den Jochbogenansatz unter dem gewölbten Schädelteil nicht sieht. Die Farmschädel besitzen keine Crista sagittalis; selbst bei dem kleinen Wildschädel hat die linea temporalis die Mediane erreicht. Infolge der geringeren Breite in der Temporalecke (Fußpunkt der linea nuchalis) verschwindet beim Farmschädel auch dieser Punkt unter dem Schädelbild. Die Abb. lassen das unterschiedliche Verhalten in der Länge des os nasale erkennen.


Oberkiefer: Die Abb. zeigen: größere Zahnmaße bei den Farmtieren, größere Kieferbreite beim kl. Farmtier gegenüber kl. Wildtier, beim kl. Farmschädel Kulissenstellung der Zähne, deutlich das im Staphylion verkleinerte Gaumenbein bei den Farmtieren und die stärkere Randstellung der Zähne bes. beim großen Farmfuchs gegenüber dem gr. Wildfuchs.

Unterkiefer: Aus den Abb. geht das kleinere Verhalten des 3. Molaren beim gr. Farmschädel, beim kl. Farmschädel die starke Kulissenstellung und Außenkippung der Zähne hervor. M_3 ist hier nicht angelegt.

W 1




F 1




W 20




F 19




W 1



F 1




W 20




F 19




W 1




F 1




W 20




F 19




W 1




F 1




W 20




F 19



Sagittal-Diagramm der Durchschnittswerte.



1. Wildschädel.




2. Farmschädel.

Horizontal-Diagramm der Durchschnittswerte.



1. Wildschädel.



2. Farmschädel.

Literaturverzeichnis.

- Andrefen, V., Normbegriff und Optimumsbegriff. Fortschr. d. Orthod. 1931. H. 2.
- Die Bedeutung der Milchmolaren und die Minderwertigkeit der ersten Molaren. Fortschr. d. Orthod. 1933. H. 1.
- Antonius, O., Grundzüge einer Stammesgeschichte der Haustiere. Jena 1922.
- Bäumler, Die morphologischen Veränderungen des Schweineschädels unter dem Einfluß der Domestikation, Arch. f. Naturgesch. 1921.
- Bethcke, H., Vergleichende Untersuchungen an Frettchen und Iltissen. Zool. Jb. 1919. Bd. 36.
- Boas, F., Veränderungen der Körperform der Nachkommen von Einwanderern in Amerika. Z. Ethnol. 1913. Bd. 45.
- Bolk, L., Über Körperlänge der Niederländer und deren Zunahme in den letzten Dezennien. Z. f. Morph. und Anthr. B. 18. 1914.
- Brehm, Tierleben.
- Darwin, Das Variieren der Tiere und Pflanzen im Zustande der Domestikation. 1868.
- Ellenberger-Baum, Handbuch der vergleichenden Anatomie der Haustiere. Berlin 1900.
- Euler, Die Bedeutung des Mineralstoff- und Vitaminmangels für die Entstehung des Gebißverfalles. Biol. Z. Tschb. Stuttgart. 1937.
- Fabian, Merkmale und Grenzen in der Domestikationsfrage am Gebiß. Berlin 1933.
- Fischer, E., Die Rassenmerkmale des Menschen als Domestikationserscheinung. Z. Morph. und Anthropol. 1914. Bd. 18.
- Schädelform und Vererbung. Z. Abst. u. Ver. 1924.
- Hahn, Ed., Die Haustiere und ihre Beziehungen zur Wirtschaft des Menschen. Leipzig 1896.
- Henseler, H., Untersuchungen über den Einfluß der Ernährung auf die morphologische und physiologische Gestaltung des Tierkörpers. Kühn-Archiv 1913 und 1914.
- Hilzheimer, Die Haustiere in Abstammung und Entwicklung. Stuttgart 1909.
- Hruska, A., Die Zahnlockerung als biologisches Problem im Rahmen der menschlichen Domestikationsercheinungen. Berlin 1931.

- Janzer, O., Die Zähne der Neu-Pommern. V.Z. 1927. H. 2 u. 3.
- Keller, Naturgeschichte der Haustiere. Berlin 1905.
- Kitt, Anomalien der Zähne unserer Haustiere. Mh. f. prakt. Tierheilk. 1892. Bd. 3.
- Klatt, B., Mendelismus, Domestikation und Kraniologie. Arch. f. Anthr. 1921. Bd. 18.
- Untersuchungen zum Domestikationsproblem. Bibliotheca genetica. 1921. Bd. 2 und 1923 Bd. 6.
- Klußmann, W., Gebißverfall und Ernährung. Stuttgart 1936.
- Die Ursachen des Gebißverfalls im einzelnen und in ihrem Zusammenhange. Biol. Zahn. Tschb. Stuttgart 1937.
- Die Formen des Gebißverfalls im einzelnen und in ihrem Zusammenhang. Ebenda.
- Korkhaus, G., Ätiologie der Zahnstellungs- und Kieferanomalien. Fortschr. d. Orthod. 1931 H. 1, 1932 H. 1, 1933 H. 1.
- Kroemer, H., Rasse, Konstitution und Gebißverfall. Biol. Zahn. Tschb. Stuttgart 1937.
- Müller, E., Vergleichende Untersuchungen an Haus- und Wildkaninchen. Zool. Jahrb. Abt. f. allg. Zool. und Physiol. Bd. 36. 1919.
- v. Nathusius, H., Vorstudien für Geschichte und Zucht der Haustiere zunächst am Schweineschädel. Berlin 1864.
- Nehring, A., Über die Gebißentwicklung der Schweine, insbesondere über Verfrühungen und Verspätungen derselben. Landw. Jb. 1888. Bd. 17.
- Über eine große wolfsähnliche Hunderrasse der Vorzeit und über ihre Abstammung. Sitzgsber. Gef. naturforsch. Freund. Berlin 1884. Nr. 9.
- Über den Einfluß der Domestikation auf die Größe der Tiere usw. Sitzgsber. d. Gef. naturforsch. Freunde. Berlin. 1888. S. 133.
- Paulsen, J., Welen und Entstehung der Rassenmerkmale im Zustande der Domestikation. 1868.
- Proell, F. W., Klima und Zivilisation in ihrer Auswirkung auf Körper und Zähne. Berlin 1934.
- Der Gebißzustand bei Natur- und zivilisierten Völkern in Beziehung zu ihrer Ernährung. Biol. Zahn. Tschb. Stuttgart 1937.
- Retzius, G., Wächst noch die Größe des menschlichen Gehirns infolge der Einwirkung der „Kultur“? Z. f. Morph. und Anthropol. Bd. 18. 1914.
- Ritter, R., Anomalien am Hundegebiß. Fortschr. d. Orthod. 1933. H. 1.

- Tornier, Über die Art, wie äußere Einflüsse den Aufbau des Tieres abändern. Verhandl. d. Zool. Gef. 20. 1911.
- Walckhoff, Die Bedeutung der Stammesgeschichte des Menschen für die Ätiologie der Kiefer und Zahnanomalien. DZ. 66. 1925.
- Weidenreich, F., Domestikation und Kultur in ihrer Wirkung auf Schädelform und Körpergestalt. Z. Konst.-Lehre 1925 (11).
- Werner, H., Das Gebiß des Menschen in der Vorgeschichte und Geschichte. Biol. Zahn. Tschb. Stuttgart 1937.
- Wolfgram, Einwirkung der Gefangenschaft auf die Gestaltung des Wolfschädels. Zool. Jb. 1894.
-

Lebenslauf.

Am 11. Febr. 1898 wurde ich, Paul Rofe, in Bernkastel-Kues geboren. In Trier besuchte ich das Gymnasium bis zur Reife für Prima. Danach erst in der Landwirtschaft und im Weinbau tätig, begann ich nach nachträglicher Ablegung der Reifeprüfung im Sommersemester 1927 das zahnärztliche Studium. Frühjahr 1929 bestand ich in Bonn die zahnärztliche Vorprüfung und im November 1930 in Freiburg das Staatsexamen. Damit erhielt ich die Approbation als Zahnarzt. Seit Mai 1931 bin ich als Assistent tätig.
